

[Бисакодил-Хемофарм](#)



Код АТХ:

- [A06AB02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бисакодил](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой** желтого цвета, круглые.

	1 таб.
бисакодил	5 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, повидон К-25, карбоксиметилкрахмал натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Состав кишечнорастворимой оболочки: сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата (1:1), макрогол 6000, тальк.

Состав сахарной оболочки: сахароза, камедь акации, макрогол 6000, тальк, краситель желтый хинолиновый (E104), титана диоксид (E171).

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство. Вызывает раздражение рецепторного аппарата кишки, оказывает непосредственное влияние на слизистую оболочку кишечника, усиливая его перистальтику и повышая секрецию слизи в толстом кишечнике.

Действие наступает через 6 ч при приеме внутрь, при приеме перед сном - через 8-12 ч.

Фармакокинетика

Не всасывается в кишечнике. Является пролекарством, в щелочной среде происходит гидролиз с образованием метаболита, оказывающего раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ.

Показания к применению:

- гипотонический и атонический запор (в т.ч. запоры у пожилых; запоры после операций и родов);
- регулирование стула (геморрой, проктит, трещины заднего прохода);
- подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Гипотония](#)
- [Запор](#)
- [Проктит](#)

Противопоказания:

- кишечная непроходимость;
- ущемленная грыжа;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- боли в животе неясного генеза;
- гастроэнтерит;
- аппендицит;
- перитонит;
- кровотечения из ЖКТ;
- метроррагия;
- цистит;
- спастические запоры;
- острый проктит;
- острый геморрой;
- детский возраст до 3-х лет.
- повышенная чувствительность.

С *осторожностью*: беременность, период лактации, печеночная и/или почечная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Таблетки принимают внутрь 1 раз/сут перед сном или за 30 мин до завтрака.

Взрослым и детям старше 14 лет препарат назначают по 1-3 таб. (5-15 мг) на прием.

Детям в возрасте 8-14 лет - по 1-2 таб. (5-10 мг), **детям в возрасте от 3-х до 7 лет** - 1 таб. (5 мг).

При *подготовке к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям* назначают по 2 таб. на ночь за сутки до исследования и по 2 таб. на ночь накануне операции или исследования.

Таблетки проглатывают целиком, не разламывая, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Побочное действие:

Возможны: кишечная колика, диарея (дегидратация, нарушение водно-электролитного обмена, мышечная слабость, судороги, снижение АД), абдоминальные боли, метеоризм, аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью: беременность, период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместное применение с антацидами может привести к преждевременному растворению его оболочки и раздражению желудка и двенадцатиперстной кишки.

Не рекомендуется принимать одновременно с молоком и щелочной минеральной водой.

Особые указания и меры предосторожности:

Бисакодил не следует назначать при лечении хронического запора в течение длительного времени (более 10 дней).

Если при применении бисакодила начнется кровотечение из прямой кишки, следует предупредить больного о прекращении приема препарата.

В результате применения препарата возможно фиолетовое окрашивание мочи и кала.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью:* почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью:* печеночная недостаточность.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте 8-14 лет - по 1-2 таб. (5-10 мг), **детям в возрасте от 3-х до 7 лет** - 1 таб. (5 мг).

Детям до 3-х лет препарат противопоказан.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Бисакодил-Хемофарм

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bisakodil-Hemofarm>