Бисакодил-OBL



Код АТХ:

- A06AB02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бисакодил

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой***	**1 таб.**
бисакодил	5 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство. Вызывает раздражение рецепторного аппарата кишки, оказывает непосредственное влияние на слизистую оболочку кишечника, усиливая его перистальтику и повышая секрецию слизи в толстом кишечнике.

Действие наступает через 6 ч при приеме внутрь (при приеме перед сном - через 8-12 ч) и в течение первого часа при ректальном введении.

Фармакокинетика

Не всасывается в кишечнике. Является пролекарством, в щелочной среде происходит гидролиз с образованием метаболита, оказывающего раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению:

— гипотонические и атонические запоры (в т.ч. запоры у пожилых; запоры после операций и родов);

— регулирование стула (геморрой, проктит, трещины заднего прохода);

— подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Относится к болезням:

- Геморрой
- Гипотония
- Запор
- Проктит

Противопоказания:

— кишечная непроходимость;

— ущемленная грыжа;

— острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;

— перитонит;

— кровотечения из желудочно-кишечного тракта;

— метроррагия;

— цистит;

— спастические запоры;

— острый проктит;

— острый геморрой;

— детский возраст до 3 лет;

— наследственная непереносимость лактозы;

— дефицит лактазы;

— синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы;

— гиперчувствительность.

С осторожностью: беременность, период лактации, печеночная и/или почечная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, перед сном или за 30 мин до завтрака, **взрослым и детям старше 14 лет** - 5-15 мг, **детям 8-14 лет** - 5-10 мг; **детям 3-7 лет** - 5 мг. Таблетки проглатывают, не разжевывая и запивая небольшим количеством воды.

Побочное действие:

Кишечная колика, диарея (дегидратация, нарушение водно-электролитного обмена, мышечная слабость, судороги, снижение артериального давления), боль в животе, метеоризм, аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместное применение с антацидами может привести к преждевременному растворению кишечнорастворимой оболочки препарата и раздражению желудка и двенадцатиперстной кишки.

Не рекомендуется принимать одновременно с молоком и щелочной минеральной водой.

Особые указания и меры предосторожности:

Не применять в течение длительного времени.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bisakodil-OBL