

[Бисакодил \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [A06AB02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бисакодил](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Суппозитории ректальные** белого или почти белого цвета с сероватым или желтоватым оттенком, торпедообразной формы, с гладкой маслянистой поверхностью.

	1 супп.
бисакодил	10 мг

Вспомогательные вещества: глицериды полусинтетические.

3 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

5 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Является пролекарством. В щелочной среде происходит гидролиз с образованием вещества, оказывающего непосредственное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки кишечника. Усиливает перистальтику, увеличивает секрецию слизи в толстом кишечнике. Действие наступает в течение первого часа после применения.

Показания к применению:

— запор, обусловленный гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки (в частности, у пожилых пациентов, после операций, родов);

— регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах;

— подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Гипотония](#)
- [Проктит](#)

Противопоказания:

- кишечная непроходимость;
- ущемленная грыжа;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- перитонит;
- кровотечения из ЖКТ;
- маточные кровотечения;
- цистит;
- спастический запор;
- острый проктит;
- острый геморрой;
- грудной возраст;
- повышенная чувствительность.

С *осторожностью* применяют препарат у беременных и кормящих женщин, а также у пациентов с заболеваниями печени и почек.

Способ применения и дозы:

Ректально, 1 раз/сут. Суппозитории вводят глубоко в прямую кишку.

Взрослые и дети старше 14 лет- по 10-20 мг (1-2 суппозитория), **детям в возрасте 8-14 лет** - по 10 мг (1 суппозиторий), **детям в возрасте 2-7 лет** - по 5 мг (1/2 суппозитория).

В случае назначения препарата для очистки кишечника при подготовке к операции или рентгенологическому исследованию органов брюшной полости Бисакодил назначают вечером 10-20 мг (2-4 таб.) внутрь и утром 10 мг (1 суппозиторий) ректально.

Побочное действие:

Аллергические реакции, раздражение прямой кишки, кишечная колика, диарея, которая может привести к чрезмерной потере жидкости и электролитов и, следовательно, к развитию мышечной слабости, судорог, артериальной гипотензии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С *осторожностью* применяют препарат у беременных и кормящих женщин.

Особые указания и меры предосторожности:

Бисакодил (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Бисакодил не следует применять для длительного лечения хронического запора.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью* применяют препарат у пациентов с заболеваниями почек.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью* применяют препарат у пациентов с заболеваниями печени.

Применение в пожилом возрасте

— запор, обусловленный гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки (в частности, у пожилых пациентов).

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте 8-14 лет - по 10 мг (1 суппозиторий), **детям в возрасте 2-7 лет** - по 5 мг (1/2 суппозитория).

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bisakodil_svechi