

## Боботик



### Код АТХ:

- [A03AX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Симетикон](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь** в виде густой непрозрачной жидкости от белого до белого с кремовым оттенком цвета с фруктовым запахом; допускается разделение на жидкий слой и осадок, которые после взбалтывания образуют однородную эмульсию.

	<b>1 мл</b>
эмульсия симетикона 30%	222.2 мг,
что соответствует содержанию симетикона	66.66 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия сахаринат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, кармеллоза натрия, лимонной кислоты моногидрат, ароматизатор малиновый, вода очищенная.

30 мл - флаконы темного стекла с пробкой-капельницей и завинчивающейся полиэтиленовой крышкой (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

**Фармакодинамика**

Препарат, уменьшающий метеоризм. Симетикон (активированный диметикон) представляет собой комбинацию метилированных линейных силоксановых полимеров, стабилизированных триметилсилоксановыми группами с кремния диоксидом. Снижая поверхностное натяжение на границе раздела фаз, затрудняет образование и способствует разрушению газовых пузырьков в содержимом кишечника и слизи ЖКТ. Высвобождаемые при этом газы могут поглощаться стенками кишечника или выводиться благодаря перистальтике. Это предупреждает образование больших газово-слизистых конгломератов, вызывающих болезненное вздутие живота.

При соно- и рентгенографии предупреждает возникновение дефектов изображения; способствует лучшему орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастными препаратами, препятствуя разрыву контрастной пленки.

Вследствие химической инертности не влияет на микроорганизмы и ферменты, присутствующие в ЖКТ. Не уменьшает всасывание пищи, не изменяет реакцию и объем желудочного сока.

**Фармакокинетика**

Симетикон после приема внутрь не всасывается из ЖКТ и выводится через кишечник в неизменном виде.

**Показания к применению:**

— усиленное газообразование и накопление газов в ЖКТ (колики, ощущение наполнения в брюшной полости, метеоризм (в т.ч. в послеоперационном периоде), синдром Ремгельда, аэрофагия);

— подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (рентгенография, сонография, гастроскопия и дуоденоскопия - для профилактики образования пены).

**Относится к болезням:**

- [Дуоденит](#)
- [Метеоризм](#)

**Противопоказания:**

- кишечная непроходимость;
- обструктивные заболевания ЖКТ;
- новорожденные до 28 дня жизни;
- повышенная чувствительность к симетикону и/или другим компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь, после еды.

Перед применением флакон следует взболтать до получения однородной эмульсии.

Для точной дозировки препарата во время закапывания флакон следует держать вертикально.

При **усиленном газообразовании и накоплении газов в ЖКТ** **детям от 28 дня жизни до 2 лет** назначают по 8 капель (20 мг симетикона) 4 раза/сут; **детям от 2 до 6 лет** - по 14 капель (35 мг симетикона) 4 раза/сут; **детям старше 6 лет и взрослым** - по 16 капель (40 мг симетикона) 4 раза/сут.

Для более удобного введения препарата, в частности маленьким детям, его можно предварительно смешать с небольшим количеством холодной кипяченой воды, детского питания или негазированной жидкости.

После исчезновения симптомов прием препарата следует прекратить.

При **подготовке к диагностическим процедурам (рентгенографическое исследование ЖКТ)** за 1 день до исследования препарат назначают 2 раза/сут (утром и вечером): **детям от 28 дня жизни до 2 лет** - 10 капель (25 мг), **детям от 2 до 6 лет** - 16 капель (40 мг), **детям старше 6 лет и взрослым** - 20 капель (50 мг).

Для **сонографического исследования ЖКТ** за 1 день до исследования препарат назначают 2 раза/сут (утром и вечером) в дозировках, рекомендованных при подготовке к рентгенографическому исследованию. За 3 ч до начала исследования дозу следует повторить.

## **Побочное действие:**

Возможно развитие аллергических реакций.

## **Передозировка:**

Сообщения о передозировке отсутствуют.

Симетикон не всасывается из ЖКТ и передозировка не представляет угрозы для жизни и здоровья.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности применение препарата возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Отсутствуют данные о безопасности применения препарата у кормящих женщин. В период кормления грудью ребенка препарат должен применяться только в случае необходимости.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Симетикон может вызывать нарушение всасывания пероральных антикоагулянтов.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат не содержит сахара, возможно применение больными с сахарным диабетом и нарушениями пищеварения.

Во время лечения не рекомендуется прием газированных напитков.

Прием препарата может исказить результаты некоторых диагностических тестов, например, тест с использованием гваяковой смолы.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает влияния на вождение транспортных средств и обслуживание механических устройств.

### **Применение в детском возрасте**

Новорожденным до 28 дня жизни препарат противопоказан.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре от 15° до 25°С.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Bobotik>