

## Бонафтон



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бромнафтохинон](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Мазь глазная** 0.05%.

|                |              |
|----------------|--------------|
|                | <b>100 г</b> |
| бромнафтохинон | 50 мг        |

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Противовирусный препарат, активен в отношении вируса Herpes simplex и некоторых аденовирусов типа 3, 7, 8. Подавляет синтез цитоплазматических белков, включающихся в состав капсидов, и нарушает транспорт компонентов вирусного капсида в клеточное ядро, где осуществляется их «сборка».

### Показания к применению:

Вирусные заболевания глаз (герпетический кератит, аденовирусный конъюнктивит и кератоконъюнктивит).

### Относится к болезням:

- [Герпес](#)
- [Кератит](#)
- [Кератоконус](#)

### Противопоказания:

Гиперчувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, беременность, лактация.

## Способ применения и дозы:

Местно. Полоску мази длиной 1 см закладывают за нижнее веко 3-4 раза в день. При герпетических заболеваниях глаз курс лечения составляет 10-12 дней, при аденовирусном конъюнктивите и кератоконъюнктивите составляет 7-10 дней.

## Побочное действие:

Аллергические реакции, жжение в глазу (обычно проходит через 5-10 мин), преходящее затуманивание зрения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или вы заметили любой другой побочный эффект, не указанный в инструкции, сообщите об этом врачу.

## Передозировка:

При применении препарата передозировка маловероятна.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан: беременность, лактация.

## Особые указания и меры предосторожности:

После применения мази возможна нечеткость зрения, поэтому необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан: возраст до 18 лет.

## Условия хранения:

При температуре не выше 15°C. Хранить в недоступном для детей месте.

*Срок годности.* 2 года. Не использовать препарат по истечении срока годности.

Срок годности после вскрытия тубы - 3 месяца.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Bonafton>