Бонафтон

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бромнафтохинон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Мазь глазная 0.05%.

	100 г
бромнафтохинон	50 мг

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противовирусный препарат, активен в отношении вируса Herpes simplexи некоторых аденовирусов типа 3, 7, 8. Подавляет синтез цитоплазматических белков, включающихся в состав капсидов, и нарушает транспорт компонентов вирусного капсида в клеточное ядро, где осуществляется их «сборка».

Показания к применению:

Вирусные заболевания глаз (герпетический кератит, аденовирусный коньюктивит и кератоконьюктивит).

Относится к болезням:

- Герпес
- Кератит
- Кератоконус

Противопоказания:

Гиперчувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, беременность, лактация.

Способ применения и дозы:

Местно. Полоску мази длиной 1 см закладывают за нижнее веко 3-4 раза в день. При герпетических заболеваниях глаз курс лечения составляет 10-12 дней, при аденовирусном коньюктивите и кератоконьюктивите составляет 7-10 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции, жжение в глазу (обычно проходит через 5-10 мин), преходящее затуманивание зрения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или вы заметили любой другой побочный эффект, не указанный в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

При применении препарата передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан: беременность, лактация.

Особые указания и меры предосторожности:

После применения мази возможна нечеткость зрения, поэтому необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказан: возраст до 18 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 15°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 2 года. Не использовать препарат по истечении срока годности.

Срок годности после вскрытия тубы - 3 месяца.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bonafton