Бонджигар



Код АТХ:

- A05C

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы твердые желатиновые, размер №0, коричневого цвета, с надписью белыми чернилами "BONJIGAR" на корпусе и колпачке; содержимое капсул - порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с характерным запахом.

	1 капс.
сухой экстракт листьев эклипты белой (Eclipta alba (L.) Hassk)	70.4 мг
сухой экстракт корневищ и корней пикроризы курроа (Picrorhiza kurroa Royle ex Benth.)	28 мг
сухой экстракт плодов паслена черного (Solanum nigrum L.)	14.4 мг
сухой экстракт семян цикория обыкновенного (Cichronium intybus L.)	48 мг
сухой экстракт корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.)	56 мг
сухой экстракт плодов тамарикса двудомного (Tamarix dioica Roxb.)	28 мг
сухой экстракт плодов редьки посевной (Raphanus sativus L.)	14.4 мг
сухой экстракт плодов барбариса остистого (Berberis aristata DC.)	42.4 мг
сухой экстракт семян и листьев расторопши пятнистой (Silybum marianum L.)	56 мг
сухой экстракт цветков и плодов сферантуса индийского (Sphaeranthus indicus L.)	14.4 мг
сухой экстракт листьев берхавии раскидистой (Boerhaavia diffusa L.)	28 мг

Вспомогательные вещества: тальк.

20 шт. - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Сироп от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с характерным запахом.

	10 мл
сухой экстракт листьев эклипты белой (Eclipta alba (L.) Hassk)	35 мг
сухой экстракт корневищ и корней пикроризы курроа (Picrorrhiza kurroa Royele ex Benth.)	35 мг
сухой экстракт плодов паслена черного (Solanum nigrum	35 мг

L.)	
сухой экстракт семян цикория обыкновенного (Cichronium intybus L.)	35 мг
сухой экстракт корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.)	35 мг
сухой экстракт плодов тамарикса двудомного (Tamarix dioica Roxb.)	7 мг
сухой экстракт плодов редьки посевной (Raphanus sativus L.)	18 мг
сухой экстракт плодов барбариса остистого (Berberis aristata DC.)	14 мг
сухой экстракт семян и листьев расторопши пятнистой (Silybum marianum L.)	70 мг
сухой экстракт цветков и плодов сферантуса индийского (Sphaeranthus indicus L.)	7 мг
сухой экстракт листьев берхавии раскидистой (Boerhaavia diffusa L.)	14 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, лимонная кислота безводная, глицерол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, ароматизатор Тутти-фрутти CG-2879, ароматизатор Шоколадная ваниль PDF-144, вода очищенная.

90 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный фитопрепарат с гепатопротекторным действием. Способствует нормализации нарушенной клеточной структуры печени, снижает повышенный уровень содержания сывороточных ферментов (АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ), продуктов перекисного окисления липидов, общего и прямого билирубина.

Фармакокинетика

В соответствии с Международной конвенцией (EMEAHMPWG11/99) при проведении клинических испытаний препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

Показания к применению:

— алкогольный стеатогепатит умеренной степени, медленно прогрессирующий (монотерапия и в составе комплексной терапии в сочетании со спазмолитиками и метоклопрамидом (церукалом)).

Противопоказания:

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— детский и подростковый возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Сироп следует назначать с *осторожностью* пациентам с сахарным диабетом.

Способ применения и дозы:

Препарат принимать внутрь по 1 капсуле или по 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза/сут после еды. Курс лечения - 6 недель.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по назначению врача.

Капсулы следует проглатывать не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Бонджигар не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно применение препарата в сочетании со спазмолитиками и метоклопрамидом (церукалом).

Особые указания и меры предосторожности:

При вирусном гепатите эффективность применения препарата не изучена.

Сироп содержит сахарозу, что необходимо учитывать при назначении пациентам с сахарным диабетом и пациентам, находящимся на гипокалорийной диете. 1 разовая доза (10 мл) содержит 8 г сахарозы, что соответствует 0.67 ХЕ.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский и подростковый возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности капсул - 2 года, сиропа - 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bondzhigar