Борная кислота (раствор)

Код АТХ:

- D08AD

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Борная кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для местного применения спиртовой 3%***	**100 мл**
борная кислота	3 г

40 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
40 мл - флаконы (100) - коробки картонные.
40 мл - флаконы (200) - коробки картонные.
40 мл - флаконы (400) - коробки картонные.
40 мл - флаконы (600) - коробки картонные.
10 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.
10 мл - флакон-капельницы (100) - коробки картонные.
10 мл - флакон-капельницы (200) - коробки картонные.
10 мл - флакон-капельницы (400) - коробки картонные.
10 мл - флакон-капельницы (600) - коробки картонные.
15 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.
15 мл - флакон-капельницы (100) - коробки картонные.
15 мл - флакон-капельницы (200) - коробки картонные.
15 мл - флакон-капельницы (400) - коробки картонные.
15 мл - флакон-капельницы (600) - коробки картонные.
25 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.
25 мл - флакон-капельницы (100) - коробки картонные.
25 мл - флакон-капельницы (200) - коробки картонные.
25 мл - флакон-капельницы (400) - коробки картонные.
25 мл - флакон-капельницы (600) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептическое средство; коагулирует белки (в т.ч. ферменты) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной стенки.

Фармакокинетика

Хорошо проникает через кожу и слизистые оболочки; медленно выводится и может накапливаться в органах и тканях. Выводится почками - 50% (в течение 12 ч), остальное количество в течение 5-7 дней.

Показания к применению:

Отит наружный (острый и хронический) без повреждения барабанной перепонки.

Противопоказания:

Гиперчувствительность, хроническая почечная недостаточность, перфорация барабанной перепонки; беременность, период лактации, детский возраст.

Способ применения и дозы:

Местно. При остром и хроническом отите по 3-5 капель наносят на турунду и вводят в наружный слуховой проход 2-3 раза в день. Курс лечения не должен превышать 3-5 дней.

Побочное действие:

Местные реакции: зуд, жжение, гиперемия кожи наружного слухового прохода.

Аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы острой интоксикации (при случайном приеме внутрь): тошнота, рвота, диарея, гастралгия, нарушение функций сердечно-сосудистой системы, стимуляция или угнетение центральной нервной системы, гиперпирексия, эритематозные высыпания с последующей десквамацией (возможен летальный исход в течение 5-7 дней), нарушение функции почек и печени (в т.ч. желтуха), циркуляторный коллапс, шок, в т.ч. с летальным исходом.

Лечение: симптоматическое. Переливание крови, гемо- и перитонеальный диализ.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан: беременность, период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Избегать попадания на слизистые оболочки.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°С. В недоступном для детей месте.

Срок годности. 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bornaya_kislota_rastvor