

## Боярышник



### Код АТХ:

- [C01EB04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Боярышника плоды](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Таблетки для рассасывания	1 таб.
экстракт цветков боярышника сухой,	100 мг
содержащий витексин-2-рамнозида	не менее 1.6 %

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Оказывает умеренное кардиотоническое, спазмолитическое и умеренное седативное действие, проявляет гипотензивные свойства, нормализует показатели свертываемости крови.

### Показания к применению:

— в составе комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности (кардиалгии, нейро-циркуляторная дистония).

### Относится к болезням:

- [Кардиалгия](#)

- [Кардит](#)

**Противопоказания:**

- беременность;
- период лактации;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Держать во рту до полного рассасывания. Препарат применяют у взрослых по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Курс лечения 20-30 дней. Повторный курс после консультации врача.

**Побочное действие:**

В отдельных случаях возможны реакции повышенной чувствительности к препарату (крапивница, зуд). При применении препарата в больших дозах возможны сонливость, артериальная гипотензия, аритмия, редко - головокружение, которые проходят при снижении дозы препарата или его отмены.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При комбинированном применении боярышника и сердечных гликозидов (строфантин, дигоксин и др.) возможно усиление кардиотонического эффекта, при совместном назначении с бета-адреноблокаторами - возможно усиление гипотензивного эффекта.

**Особые указания и меры предосторожности:*****Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 18 лет.

**Условия хранения:**

При температуре не выше 25°C, в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Boyarishnik>