

Боярышника цветки



Код АТХ:

- [C01EB04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Боярышника цветки](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Оказывает антиаритмическое и гипотензивное действие, улучшает коронарное и мозговое кровообращение, урежает ЧСС. Понижает возбудимость ЦНС, уменьшает содержание холестерина в крови и увеличивает количество лецитина; нормализует показатели свертываемости крови. При гипогалактии увеличивает лактацию, устраняет диспепсические явления у детей грудного возраста. Гипотензивное действие выражено сильнее, чем у плодов боярышника.

Показания к применению:

Тахикардия, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность (I-IIa ст.), атеросклероз, стенокардия (в т.ч. вазоспастическая стенокардия), нейроциркуляторная дистония, астеноневротические состояния, постинфарктный кардиосклероз, мерцательная тахикардия, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, экстрасистолия, дигиталисная интоксикация; бессонница, тиреотоксикоз; пневмония, ОРВИ, кардиалгия, климактерический синдром (в составе комбинированной терапии).

Относится к болезням:

- [Артериальная гипертензия](#)
- [Астения](#)
- [Атеросклероз](#)
- [Гипертензия](#)

- [Интоксикация](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардиосклероз](#)
- [Кардит](#)
- [Климактерический синдром](#)
- [Нейроциркуляторная дистония](#)
- [Пароксизм](#)
- [Пневмония](#)
- [Стенокардия](#)
- [Тахикардия](#)
- [Тиреотоксикоз](#)
- [Экстрасистолия](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь, в виде настоя, по 15-30 мл 2-3 раза/сут.

Для приготовления настоя 5 г (1 ст.ложка) сырья помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Побочное действие:

Аллергические реакции; брадикардия (при длительном применении); тошнота, рвота, кишечная колика (при приеме натощак).

Источник: http://drugs.thead.ru/Boyaryshnika_Cvetki