

[Боярышника настойка](#)



Код АТХ:

- [C01EB04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Боярышника плоды](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Настойка	1 л
боярышника плоды	100 г

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает умеренное кардиотоническое, спазмолитическое, седативное действие.

Показания к применению:

Настойку боярышника применяют в комплексной терапии функциональных расстройств сердечной деятельности, кардиалгии, климактерического синдрома, астено-невротических состояний.

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)

- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст от 12 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Взрослым по 20-30 капель 3-4 раза в день до еды. Курс лечения 20-30 дней. Детям старше 12 лет - по 10-15 капель 3-4 раза в день до еды. Курс лечения 20-30 дней.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможны аллергические реакции (крапивница, зуд), брадикардия (при длительном применении), при применении в больших дозах - снижение артериального давления, головокружение, тремор, сонливость.

Передозировка:

При превышении рекомендуемых доз возможно усиление побочных эффектов. Лечение симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан: беременность, период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При совместном применении настойки боярышника и сердечных гликозидов (в том числе строфантин, дигоксин) происходит усиление кардиотонического эффекта; с бета-адреноблокаторами - возможно усиление гипотензивного эффекта.

Особые указания и меры предосторожности:

Содержание абсолютного спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых содержится 0.45 г, для детей - 0.23 г; в максимальной суточной дозе препарата для взрослых содержится 1.8 г, для детей - 0.9 г.

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при потенциально опасных видах деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

При нарушениях функции печени

С осторожностью: заболевания печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан: детский возраст до 12 лет. С осторожностью: детский возраст от 12 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Боярышника настойка

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Срок годности. 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Boyaryshnika_Nastoyka