Боярышника цветки



Код АТХ:

- C01EB04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Боярышника цветки

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Оказывает антиаритмическое и гипотензивное действие, улучшает коронарное и мозговое кровообращение, урежает ЧСС. Понижает возбудимость ЦНС, уменьшает содержание холестерина в крови и увеличивает количество лецитина; нормализует показатели свертываемости крови. При гипогалактии увеличивает лактацию, устраняет диспепсические явления у детей грудного возраста. Гипотензивное действие выражено сильнее, чем у плодов боярышника.

Показания к применению:

Тахикардия, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность (I-IIa ст.), атеросклероз, стенокардия (в т.ч. вазоспастическая стенокардия), нейроциркуляторная дистония, астеноневротические состояния, постинфарктный кардиосклероз, мерцательная тахиаритмия, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, экстрасистолия, дигиталисная интоксикация; бессонница, тиреотоксикоз; пневмония, ОРВИ, кардиалгия, климактерический синдром (в составе комбинированной терапии).

Относится к болезням:

- Артериальная гипертензия
- Астения
- Атеросклероз
- Гипертензия

- Интоксикация
- Кардиалгия
- Кардиосклероз
- Кардит
- Климактерический синдром
- Нейроциркуляторная дистония
- Пароксизм
- Пневмония
- Стенокардия
- Тахикардия
- Тиреотоксикоз
- Экстрасистолия

Противопоказания:

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь, в виде настоя, по 15-30 мл 2-3 раза/сут.

Для приготовления настоя 5 г (1 ст.ложка) сырья помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Побочное действие:

Аллергические реакции; брадикардия (при длительном применении); тошнота, рвота, кишечная колика (при приеме натощак).

Источник: http://drugs.thead.ru/Boyaryshnika_cvetki