

## [Боярышника настойка](#)



### **Код АТХ:**

- [C01EB04](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Боярышника плоды](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

<b>Настойка</b>	<b>1 л</b>
боярышника плоды	100 г

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Оказывает умеренное кардиотоническое, спазмолитическое, седативное действие.

### **Показания к применению:**

Настойку боярышника применяют в комплексной терапии функциональных расстройств сердечной деятельности, кардиалгии, климактерического синдрома, астено-невротических состояний.

### **Относится к болезням:**

- [Астения](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)

- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

## **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

*С осторожностью:* заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст от 12 лет.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь. Взрослым по 20-30 капель 3-4 раза в день до еды. Курс лечения 20-30 дней. Детям старше 12 лет - по 10-15 капель 3-4 раза в день до еды. Курс лечения 20-30 дней.

## **Побочное действие:**

В отдельных случаях возможны аллергические реакции (крапивница, зуд), брадикардия (при длительном применении), при применении в больших дозах - снижение артериального давления, головокружение, тремор, сонливость.

## **Передозировка:**

При превышении рекомендуемых доз возможно усиление побочных эффектов. Лечение симптоматическое.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан: беременность, период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При совместном применении настойки боярышника и сердечных гликозидов (в том числе строфантин, дигоксин) происходит усиление кардиотонического эффекта; с бета-адреноблокаторами - возможно усиление гипотензивного эффекта.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Содержание абсолютного спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых содержится 0.45 г, для детей - 0.23 г; в максимальной суточной дозе препарата для взрослых содержится 1.8 г, для детей - 0.9 г.

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при потенциально опасных видах деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

### ***При нарушениях функции печени***

С осторожностью: заболевания печени.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан: детский возраст до 12 лет. С осторожностью: детский возраст от 12 лет.

## **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Боярышника настойка**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

*Срок годности.* 2 года. Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Boyaryshnika\\_nastoyka](http://drugs.thead.ru/Boyaryshnika_nastoyka)