Боярышника плоды



Код АТХ:

- C01EB04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Боярышника плоды

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сырье растительное - порошок***	**1 фильтр-пакет**
плоды боярышника	2.8 г

2.8 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.
2.8 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.

◊ ***Сырье растительное - порошок***	**1 фильтр-пакет**
плоды боярышника	2.8 г

2,8 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.

◊ ***Сырье растительное цельное***	**1 пачка**
плоды боярышника	100 %

30 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
35 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
50 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
75 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
100 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
140 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

◊ ***Сырье растительное***	**1 пакет**
плоды боярышника	50 г

50 г - Пакеты бумажные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает кардиотоническое, спазмолитическое и умеренное седативное действие, проявляет гипотензивные свойства, нормализует показатели свертываемости крови.

Показания к применению:

— в комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности (нейро-циркуляторная дистония, кардиалгии).

Относится к болезням:

- Кардиалгия
- Кардит

Противопоказания:

— беременность (I триместр);

— детский возраст (до 12 лет);

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Около 15 г (1 столовая ложка) плодов помешают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 30 мин, охлаждают при комнатной температуре в течение 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1/2 стакана 2-3 раза/сут за 30 мин до еды. Курс лечения 20-30 дней.

Перед применением отвар рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Аллергические реакции (крапивница, зуд), брадикардия (при длительном применении), при применении в больших дозах - снижение АД, сонливость.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности во II и III триместре и в период грудного вскармливания.

Применение возможно с учетом ожидаемой пользы для матери и потенциального риска для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При комбинированном применении с сердечными гликозидами происходит усиление карднотонического эффекта; с бета-адреноблокаторами - усиление гипотензивного эффекта.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Применение лекарственного препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте.

Приготовленное водное извлечение - в темном прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Boyaryshnika_plody