Броменвал



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат с седативным действием.

Показания к применению:

— вегето-сосудистая дистония (по гипертоническому типу);

— невроз;

— повышенная нервная возбудимость.

Относится к болезням:

- Вегето-сосудистая дистония
- Гипертония
- Неврит
- Неврозы

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— артериальная гипотензия;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 15-20 капель 3 раза/сут до еды.

Побочное действие:

Аллергические реакции, при длительном применении - запоры, явления бромизма (ринит, кашель, конъюнктивит, вялость, ослабление памяти, кожная сыпь).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При совместном применении с сердечными гликозидами - усиление действия сердечных гликозидов (благодаря наличию в составе препарата настойки боярышника).

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bromenval