

## Бромкамфора



### Код АТХ:

- [N05CM](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бромкамфора](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Таблетки</b>	<b>1 таб.</b>
бромкамфора	250 мг

30 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

30 шт. - банки темного стекла (1) 10 мл - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Седативное средство - препарат брома. Как и другие бромиды обладает способностью усиливать процессы торможения в коре головного мозга, особенно при повышенной возбудимости ЦНС. Облегчает наступление естественного сна.

#### Фармакокинетика

Легко абсорбируется в ЖКТ. Проникает через гистогематические барьеры, включая плацентарный. Гидроксилуется в печени до оксиметаболитов, которые в виде глюкуронидов выводятся почками.

### Показания к применению:

— повышенная возбудимость;

— астения;

- кардиалгия;
- тахикардия;
- лабильность артериального давления.

**Относится к болезням:**

- [Астения](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Тахикардия](#)

**Противопоказания:**

- печеночная и/или почечная недостаточность;
- детский возраст до 7 лет;
- повышенная чувствительность к камфоре, бромидам или другим компонентам препарата.

*С осторожностью:* пациентам с нарушениями функции печени, с аллергическими заболеваниями в анамнезе.

**Способ применения и дозы:**

Внутрь, после еды. **Взрослым и детям старше 14 лет** - по 1-2 таб. 2-3 раза/сут; **детям в возрасте 7-10 лет** - по 1 таб. 2 раза/сут; **детям в возрасте 10-14 лет** - по 1 таб. 2-3 раза/сут. Максимальная суточная доза: для **взрослых и детей старше 14 лет** - 1.5 г; для **детей в возрасте 7-10 лет** - 0.5 г; для **детей в возрасте 10-14 лет** - 0.75 г. Курс лечения - 10-15 дней.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции, заторможенность, сонливость, диспептические явления.

**Передозировка:**

*Симптомы:* тошнота, рвота, боль в животе, повышение температуры, анурия, делирий, мышечное подергивание, эпилептиформные судороги, угнетение центральной нервной системы, затрудненное дыхание, характерный запах камфоры в выдыхаемом воздухе, дыхательная недостаточность, кома.

*Лечение:* промывание желудка, назначение внутрь солевых слабительных и активированного угля внутрь. При судорогах применяют в/в диазепам или быстродействующие барбитураты (тиопентал натрия). Гемодиализ с липидным диализатом.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности и в период грудного вскармливания применяется по согласованию с врачом. Необходимо соотнести пользу от применения у матери и риск для плода или ребенка.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Проконсультируйтесь с врачом, если Вы принимаете другие препараты.

**Особые указания и меры предосторожности:**

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:*

## **Бромкамфора**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

В период лечения пациентам следует избегать вождения автотранспорта и другой деятельности, требующей высокой концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при почечной недостаточности.

### **При нарушениях функции печени**

С осторожностью: пациентам с нарушениями функции печени. Противопоказан при печеночной недостаточности.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан:

— детский возраст до 7 лет.

**Детям старше 14 лет** - по 1-2 таб. 2-3 раза/сут; **детям в возрасте 7-10 лет** - по 1 таб. 2 раза/сут; **детям в возрасте 10-14 лет** - по 1 таб. 2-3 раза/сут. Максимальная суточная доза: для **детей старше 14 лет** - 1.5 г; для **детей в возрасте 7-10 лет** - 0.5 г; для **детей в возрасте 10-14 лет** - 0.75 г. Курс лечения - 10-15 дней.

## **Условия хранения:**

Препарат хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

По истечении срока годности препарат не применять.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Bromkamfora>