

[Бромкамфора Рацемическая](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Седативное средство - препарат брома.

Фармакокинетика

Легко абсорбируется в ЖКТ. Проникает через гистогематические барьеры, включая плацентарный.

Гидроксилуруется в печени до оксиметаболитов, которые в виде глюкуронидов выводятся почками.

Показания к применению:

- повышенная возбудимость;
- астения;
- кардионеврозы (кардиалгия, тахикардия, лабильность АД).

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Тахикардия](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- печеночная и/или почечная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Бромкамфора Рацемическая

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Внутрь, после еды. **Взрослым** - 150-500 мг 2-3 раза/сут; **детям в возрасте до 2 лет** - 50 мг, **3-6 лет** - 100 мг, **7-9 лет** - 150 мг, **10-14 лет** - 150-250 мг 2-3 раза/сут.

Курс лечения - 10-15 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции, диспепсические явления.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, боль в животе, повышение температуры, анурия, делирий, мышечное подергивание, эпилептиформные судороги, угнетение ЦНС, затрудненное дыхание, характерный запах камфоры в выдыхаемом воздухе, дыхательная недостаточность, кома.

Лечение: промывание желудка, назначение солевых слабительных и активированного угля внутрь. При судорогах - в/в диазепам или быстродействующие барбитураты (тиопентал натрия). Гемодиализ с липидным диализатом.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказание — почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказание — печеночная недостаточность.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bromkamfora_Racemicheskaya