# Бронхалис-Хель



#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия PЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

#### Форма выпуска:

 $\Diamond$  **Таблетки подъязычные гомеопатические** от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтоватыми или сероватыми вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской; со слабым запахом креозота, исчезающим при хранении.

Aparterium	
	1 таб.
Atropa bella-donna (атропа белла-донна) D4	30 мг
Sticta (стикта) D4	30 мг
Tartarus stibiatus (тартарус стибиатус) D4	30 мг
Kreosotum (креозотум) D5	30 мг
lpecacuanha (ипекакуана) D4	<b>В</b> 0 мг
Bryonia cretica (бриония кретика) D4	60 мг
Hvoscvamus niger (гиосциамус нигер) D4	60 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

# Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего средства при обструктивных и воспалительных заболеваниях дыхательных путей (катар курильщика, хронический бронхит, трахеит).

#### Относится к болезням:

Трахеит

## Противопоказания:

— детский возраст до 3-х лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

#### Способ применения и дозы:

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.

Курс лечения - 2-3 недели. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом.

Применение препарата у детей старше 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

#### Побочное действие:

В редких случаях возможны аллергические реакции.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данной заболевании.

## Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0.025 XE.

#### Применение в детском возрасте

Применение препарата у детей старше 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

## Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от  $15^{\circ}$ C до  $25^{\circ}$ C. Хранить в недоступном для детей месте!

#### Срок годности:

5 лет

## Условия отпуска в аптеке:

**Бронхалис-Хель** Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Bronhalis-Hel