

[Бронхалис-Хель](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки подъязычные гомеопатические** от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтоватыми или сероватыми вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской; со слабым запахом креозота, исчезающим при хранении.

	1 таб.
Atropa bella-donna (атропа белла-донна) D4	30 мг
Sticta (стикта) D4	30 мг
Tartarus stibiatus (тартарус стибиатус) D4	30 мг
Kreosotum (креозотум) D5	30 мг
Ipecacuanha (ипекакуана) D4	30 мг
Bryonia cretica (бриония кретика) D4	60 мг
Huoscyaumus niger (гиосциамус нигер) D4	60 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего средства при обструктивных и воспалительных заболеваниях дыхательных путей (катар курильщика, хронический бронхит, трахеит).

Относится к болезням:

- [Трахеит](#)

Противопоказания:

— детский возраст до 3-х лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.

Курс лечения - 2-3 недели. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом.

Применение препарата у **детей старше 3 лет** возможно по назначению и под контролем врача.

Побочное действие:

В редких случаях возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данной заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0.025 ХЕ.

Применение в детском возрасте

Применение препарата у **детей старше 3 лет** возможно по назначению и под контролем врача.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Бронхалис-Хель

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bronhalis-Hel>