

## [Бронхикум С](#)



### **Код АТХ:**

- R05CA

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- Тимьяна обыкновенного травы экстракт

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- Органотропные средства

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство растительного происхождения. Бактерицидный и фунгицидный эффекты связаны с компонентами эфирного масла, в т.ч. с тимолом, карвакролом, борнеолом, пиненом, урсоловой кислотой. Проявляет выраженные отхаркивающий, муколитический и бронхолитический эффекты, уменьшает отек и воспаление слизистой оболочки бронхов, активизирует иммунную систему. Антигипоксическая активность выражена умеренно и связана с линалоолом, гераниолом, оксикоричной кислотой, флавоноидами (гликозидами лютеолина, апигенина), магнием и селеном. Фенольные соединения раздражают слизистую оболочку ЖКТ, увеличивают секрецию пищеварительных желез, оказывают карминативное и мочегонное действие. Повышение АД обусловлено действием тимола, эффект развивается постепенно, сохраняется длительное время, проявляется только у лиц с артериальной гипотензией.

Благодаря седативному, обезболивающему и мягкому утеротоническому действию эффективен при альгоменорее, дисменорее.

При наружном применении препараты тимьяна наряду с противомикробным действием оказывают противоздушный и обезболивающий эффекты.

### **Показания к применению:**

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания, стоматиты, гингивиты, синуситы, гайморит; бронхиальная астма; коклюш; нейроциркуляторная дистония по гипотензивному типу; гинекологические заболевания, альгоменорея, дисменорея; хронические гастриты с пониженной секрецией, энтероколиты, ферментопатии, дискинезии ЖКТ, дисбактериоз; дерматиты, невриты, радикулиты, миозиты, артриты.

**Относится к болезням:**

- [Артralгия](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Астма](#)
- [Гайморит](#)
- [Гастрит](#)
- [Гингивит](#)
- [Гипотензия](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Дисменорея](#)
- [Инфекции](#)
- [Коклюш](#)
- [Неврит](#)
- [Нейроциркуляторная дистония](#)
- [Радикулит](#)
- [Синусит](#)
- [Стоматит](#)
- [Энтерит](#)

**Противопоказания:**

Для приема внутрь: гастриты с повышенной секрецией.

Повышенная чувствительность к тимьяну.

**Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь в виде приготовленного настоя травы по 50-100 мл в теплом виде 2-4 раза/сут после еды; при заболеваниях ЖКТ - за 15-30 мин до еды. В виде готовых лекарственных форм применяется в соответствующем режиме дозирования.

Наружно может быть использован в виде ванн.

**Побочное действие:**

Возможно: аллергические реакции. При передозировке - тошнота.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препараты тимьяна в высоких дозах не рекомендуется применять при беременности из-за угрозы выкидыша.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Ванны не назначают при высокой температуре тела, артериальной гипертензии, тяжелой сердечной недостаточности.

При применении у детей требуется коррекция режима дозирования.

**Применение в детском возрасте**

При применении у детей требуется коррекция режима дозирования.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Bronhikum\\_S](http://drugs.thead.ru/Bronhikum_S)