

## Бронхикум С (сироп)



### Код АТХ:

- [R05CA](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тимьяна обыкновенного травы экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Сироп** прозрачный или с легкой опалесценцией, красновато-коричневого цвета, со слабым запахом меда.

	<b>100 мл</b>
жидкий экстракт травы тимьяна (1:2-2.5)	15 г

*Вспомогательные вещества:* натрия бензоат, масло розовое, ароматизатор медовый, ароматизатор вишневый (сок вишневый концентрированный), сахарный инвертный сироп (сахароза, декстроза, фруктоза), декстроза жидкая, сахарный сироп 67% (сахароза), лимонной кислоты моногидрат, вода очищенная.

*Экстрагент:* р-р аммиака 10%, глицерол 85%, этанол 90 об.%, вода (в соотношении 1:20:70:109).

100 мл - флаконы стеклянные (1) в комплекте с дозировочным стаканчиком - пачки картонные.

130 г - флаконы стеклянные (1) в комплекте с дозировочным стаканчиком - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, бронхолитическое, противомикробное действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

### Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

### Противопоказания:

- врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-фруктозная мальабсорбция;
- недостаточность ферментов сахаразы и изомальтазы;
- хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации);
- тяжелые нарушения функции печени и почек;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 6 месяцев);
- в связи с содержанием в препарате этилового спирта сироп Бронхикум С не должен использоваться у больных алкоголизмом;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* и только после консультации с врачом следует принимать сироп пациентам с заболеваниями печени, заболеваниями и травмами головного мозга, эпилепсией.

### Способ применения и дозы:

Если врач не назначил другого режима дозирования, **взрослым и подросткам** назначают внутрь после еды по 2 чайные ложки сиропа (10 мл) 3 раза/сут;

**детям от 6 до 12 лет** - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза/сут;

**детям от 2 до 6 лет** - по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза/сут;

**детям от 1 года до 2 лет** - по 1/2 чайной ложке (2.5 мл) 3 раза/сут;

**детям от 6 месяцев до 12 лет** - по 1/2 чайной ложке (2.5 мл) 2 раза/сут.

Сироп от кашля следует принимать через равные промежутки времени в течение суток.

Длительность применения препарата определяется терапевтической необходимостью и продолжительностью заболевания.

### Побочное действие:

В редких случаях возможны следующие реакции/

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, крапивница, а также отек лица и слизистой полости рта и глотки (отек Квинке).

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, гастрит, диспепсия.

### Передозировка:

## **Бронхикум С (сироп)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Не сообщалось о случаях развития интоксикации при приеме сиропа от кашля Бронхикум С.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат не рекомендуется при беременности и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Сироп от кашля Бронхикум С содержит 5.6 объемных % спирта этилового. В случае, если улучшения состояния больного не наступает или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу.

Информация для больных сахарным диабетом: 5 мл сиропа (примерно 1 чайная ложка) соответствуют 0.3 ХЕ (хлебных единиц).

#### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при тяжелых нарушениях функции почек.

#### ***При нарушениях функции печени***

С *осторожностью* и только после консультации с врачом следует принимать сироп пациентам с заболеваниями печени.

Противопоказан при тяжелых нарушениях функции печени.

#### ***Применение в детском возрасте***

По показаниям.

### **Условия хранения:**

Хранить препарат при температуре ниже 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

После вскрытия флакона сироп от кашля можно принимать в течение 3 месяцев.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Bronhikum\\_S\\_sirop](http://drugs.thead.ru/Bronhikum_S_sirop)