Бронхикум С (сироп)



Код АТХ:

- R05CA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сироп*** прозрачный или с легкой опалесценцией, красновато-коричневого цвета, со слабым запахом меда.

	100 мл
жидкий экстракт травы тимьяна (1:2-2.5)	15 г

Вспомогательные вещества: натрия бензоат, масло розовое, ароматизатор медовый, ароматизатор вишневый (сок вишневый концентрированный), сахарный инвертный сироп (сахароза, декстроза, фруктоза), декстроза жидкая, сахарный сироп 67% (сахароза), лимонной кислоты моногидрат, вода очищенная.

Экстрагент: р-р аммиака 10%, глицерол 85%, этанол 90 об.%, вода (в соотношении 1:20:70:109).

100 мл - флаконы стеклянные (1) в комплекте с дозировочным стаканчиком - пачки картонные.
130 г - флаконы стеклянные (1) в комплекте с дозировочным стаканчиком - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает отхаркивающее. противовоспалительное, бронхолитическое, противомикробное действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Противопоказания:

— врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-фруктозная мальабсорбция;

— недостаточность ферментов сахаразы и изомальтазы;

— хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации);

— тяжелые нарушения функции печени и почек;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст (до 6 месяцев);

— в связи с содержанием в препарате этилового спирта сироп Бронхикум С не должен использоваться у больных алкоголизмом;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* и только после консультации с врачом следует принимать сироп пациентам с заболеваниями печени, заболеваниями и травмами головного мола, эпилепсией.

Способ применения и дозы:

Если врач не назначил другого режима дозирования, **взрослым и подросткам** назначают внутрь после еды по 2 чайные ложки сиропа (10 мл) 3 раза/сут;

детям от 6 до 12 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза/сут;

детям от 2 до 6 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза/сут;

детям от 1 года до 2 лет - по 1/2 чайной ложке (2.5 мл) 3 раза/сут;

детям от 6 месяцев до 12 лег - по 1/2 чайной ложке (2.5 мл) 2 раза/сут.

Сироп от кашля следует принимать через равные промежутки времени в течение суток.

Длительность применения препарата определяется терапевтической необходимостью и продолжительностью заболевания.

Побочное действие:

В редких случаях возможны следующие реакции/

Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, а также отек лица и слизистой полости рта и глотки (отек Квинке).

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, гастрит, диспепсия.

Передозировка:

Не сообщалось о случаях развития интоксикации при приеме сиропа от кашля Броихикум С.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не рекомендуется при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременных прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Сироп от кашля Бронхикум С содержит 5.6 объемных % спирта этилового. В случае, если улучшения состояния больного не наступает или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу.

Информация для больных сахарным диабетом: 5 мл сиропа (примерно 1 чайная ложка) соответствуют 0.3 ХЕ (хлебных единиц).

При нарушениях функции почек

Противопоказан при тяжелых нарушениях функции почек.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью* и только после консультации с врачом следует принимать сироп пациентам с заболеваниями печени.

Противопоказан при тяжелых нарушениях функции печени.

Применение в детском возрасте

По показаниям.

Условия хранения:

Хранить препарат при температуре ниже 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

После вскрытия флакона сироп от кашля можно принимать в течение 3 месяцев.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bronhikum_S_sirop