

## [Бронхикум ТП](#)



### Код АТХ:

- [R05CA10](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Первоцвета корней экстракт](#)
- [Тимьяна обыкновенного травы экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Эликсир** прозрачный или слегка мутный, от красновато-коричневого до темно-коричневого цвета, со слабо выраженным запахом тимьяна.

	<b>100 г</b>
экстракт травы тимьяна жидкий (1:2-2.5)*	5 г
экстракт корней первоцвета жидкий (1:2-2.5)**	2.5 г

*Вспомогательные вещества:* натрия бензоат, сахарный сироп специальный (смесь сахарозы, декстрозы (глюкозы), фруктозы), вода очищенная.

\* *Экстрагент:* р-р аммиака 10%, глицерол 85%, этанол 90 об.%, вода (в соотношении 1:20:70:109).

\*\* *Экстрагент:* этанол 70%.

130 г - флаконы стеклянные с навинчивающейся пластмассовой крышкой с контролем первого вскрытия (1) в комплекте с пластмассовым стаканчиком-дозатором - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Отхаркивающий препарат растительного происхождения. Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, бронхолитическое, противомикробное действие. Способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

**Фармакокинетика**

В соответствии с Международной конвенцией (ЕМЕАНMPWG11/99) при проведении клинических исследований препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

**Показания к применению:**

— в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (в т.ч. бронхита, трахеита), сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

**Относится к болезням:**

- [Бронхит](#)
- [Трахеит](#)

**Противопоказания:**

- хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации);
- тяжелые нарушения функции печени;
- тяжелые нарушения функции почек;
- врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-фруктозная мальабсорбция, недостаточность ферментов сахаразы и изомальтазы;
- детский возраст до 1 года;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

В связи с содержанием в препарате этилового спирта эликсир Бронхикум ТП не следует применять у больных алкоголизмом.

С *осторожностью* и только после консультации с врачом следует принимать эликсир пациентам с заболеваниями печени, заболеваниями и травмами головного мозга, эпилепсией.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь.

**Взрослым и подросткам** - по 1 чайной ложке эликсира (5 мл) до 6 раз/сут.

**Детям от 5 до 12 лет** - по 1 чайной ложке эликсира (5 мл) до 4 раз/сут.

**Детям от 1 года до 4 лет** - по 1/2 чайной ложки (2.5 мл) до 3 раз/сут.

Препарат следует принимать через равные промежутки времени в течение суток.

Средний курс лечения составляет 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

**Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* редко - кожная сыпь, крапивница, отек лица и слизистой полости рта и глотки (отек Квинке).

*Со стороны пищеварительной системы:* редко - тошнота, гастрит, диспепсия.

При развитии перечисленных выше или каких-либо других побочных реакций пациент должен прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

## **Передозировка:**

Не сообщалось о случаях развития интоксикации при приеме эликсира Бронхикум ТП.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Эликсир Бронхикум ТП содержит 5.46 об.% этанола.

Если улучшение состояния больного не наступает, или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры, следует немедленно обратиться к врачу.

При необходимости применения препарата у больных сахарным диабетом следует учитывать, что 5 мл эликсира (примерно 1 чайная ложка) соответствуют 0.36 XE.

### ***При нарушениях функции почек***

При тяжелых нарушениях функции почек применение препарата противопоказано.

### ***При нарушениях функции печени***

С осторожностью и только после консультации с врачом следует применять препарат у пациентов с заболеваниями печени. При тяжелых нарушениях функции печени применение препарата противопоказано.

### ***Применение в детском возрасте***

Препарат применяют у детей старше 1 года.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре ниже 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Bronhikum\\_TP](http://drugs.thead.ru/Bronhikum_TP)