

Бронхиол



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Сироп** в виде коричневой вязкой жидкости с характерным запахом; допускается легкое помутнение.

	100 мл
экстракт подорожника	5 г
экстракт листьев мать-и-мачехи	5 г
масло мяты перечной	10 мг
масло эвкалиптовое	10 мг

Вспомогательные вещества: мед, краситель пищевой "карамель", сахароза, калия сорбат, вода очищенная.

100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

200 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

250 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения; оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии острых и хронических заболеваний дыхательных путей (трахеит, трахеобронхит, бронхит, бронхопневмония).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Бронхопневмония](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

Противопоказания:

- гиперацидный гастрит;
- язвенная болезнь желудка с повышенной кислотностью;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 6 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: больным сахарным диабетом (из-за высокого содержания сахара в препарате).

Способ применения и дозы:

Препарат применяется внутрь.

Детям от 6 до 10 лет - по 1 чайной ложке 2-3 раза в день;

детям от 10 до 15 лет - по 2 чайные ложки 2-3 раза в день;

взрослым и детям старше 15 лет - по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день.

Курс лечения 2-3 недели.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаи передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сироп от кашля с подорожником и мать-и-мачехой не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 6 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 30°C, в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bronhinol>