

Бронхипрет

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Бронхипрет



Код АТХ:

- [R05CA10](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Плюща листьев экстракт](#)
- [Тимьяна обыкновенного травы экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLS VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Сироп** в виде прозрачной ароматной жидкости светло-коричневого цвета; возможно выпадение осадка в процессе хранения.

	100 г
жидкий экстракт травы тимьяна (<i>Thymus vulgaris</i>)(1:2-2.5; экстрагирующее вещество по DAB10)	1.5 г
жидкий экстракт листьев плюща (<i>Hedera helix</i>) (1:1; экстрагирующее вещество: этанол 70% в объемном отношении)	1.5 г

Вспомогательные вещества: этанол (7% в объемном отношении), мальтитный сироп, калия сорбат, лимонной кислоты моногидрат, вода очищенная.

50 мл - флаконы темного стекла (1) с дозирующим капельным устройством и мерным стаканчиком - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) с дозирующим капельным устройством и мерным стаканчиком - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Отхаркивающее средство растительного происхождения. Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, секретолитическое, бронхолитическое действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего средства при лечении острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты (трахеит, трахеобронхит, бронхит).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 3 мес;

Вследствие наличия этанола не рекомендуется назначать препарат при алкоголизме, эпилепсии, заболеваниях печени, заболеваниях и травмах головного мозга.

Способ применения и дозы:

Препарат назначается внутрь, после еды.

При назначении соответственно возрасту:

Детям от 3 месяцев до 12 месяцев: по 10-16 капель 3 раза/сут.

Детям старше 1 года: по 17 капель (с прибавлением по 3 капли на каждый дополнительный год жизни) 3 раза/сут.

При назначении соответственно массе тела:

Детям от 3 месяцев до 12 месяцев: по 10-16 капель 3 раза/сут.

Детям старше 1 года: по (общее число капель = 1 капля на кг массы тела + 10 капель) 3 раза/сут.

Возраст (годы)	Масса тела (кг)	Количество капель (разовая доза)
от 3 до 12 месяцев	До 10	10-16
1-2	10-11	17
2-3	12-13	20
3-4	14-15	23
4-5	16-18	26
5-6	19-20	29
6-7	21-23	32
7-8	24-25	35
8-9	26-28	38
9-10	29-31	41
10-11	32-34	44
11-12	35-37	47
12-13	38-39	50

Если масса тела значительно отличается от указанной в таблице данной возрастной категории, то назначение препарата должно быть ориентировано только на массу тела пациента.

С использованием прилагаемого мерного стаканчика:

Бронхипрет

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Дети от 3 до 12 месяцев - 1.1 мл 3 раза/сут; **дети от года до 2 лет** - 2.2 мл 3 раза/сут; **дети от 2 до 6 лет** - 3.2 мл 3 раза/сут; **дети от 6 до 12 лет** - 4.3 мл 3 раза/сут; **подростки с 12 лет и взрослые** - 5.4 мл 3 раза/сут.

Неразведенный сироп Бронхипрет рекомендуется запивать водой.

Курс лечения – 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: возможны боли в области желудка, рвота, диарея.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется назначать препарат Бронхипрет при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сироп Бронхипрет не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Возможна комбинация с антибактериальными лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Если при применении препарата в течение 10-14 дней симптомы заболевания сохраняются, следует обратиться за консультацией к врачу.

Препарат содержит 7% этанола (в объемном отношении). Максимально рекомендуемая для взрослых разовая доза препарата 5.4 мл содержит 0.297 г алкоголя.

Препарат следует с осторожностью назначать детям (из-за возможного негативного влияния этанола).

Препарат может назначаться больным сахарным диабетом, так как разовая доза содержит менее 0.03 учитываемых хлебных единиц.

При длительном хранении сироп Бронхипрет может помутнеть, что не влияет на его эффективность.

Перед употреблением содержимое флакона следует взбалтывать.

При нарушениях функции печени

Не рекомендуется назначать препарат при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

С осторожностью следует назначать препарат детям из-за возможного негативного влияния этанола.

Препарат в форме капель назначают **подросткам в возрасте 12-18 лет** - по 28 капель 4 раза/сут; **детям в возрасте 6-11 лет** - по 25 капель 4 раза/сут.

Препарат в форме сиропа следует назначать **детям** в зависимости от возраста или массы тела 3 раза/сут.

При назначении соответственно возрасту **детям от 3 до 12 мес** назначают по 10-16 капель, **детям старше 1 года** - по 17 капель, прибавляя по 3 капли на каждый дополнительный год жизни.

При назначении соответственно массе тела **детям от 3 до 12 мес** назначают по 10-16 капель, **детям старше 1 года**

Бронхипрет

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- по (общее число капель=1 капля/кг массы тела+10 капель).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bronhipret>