

Бронхипрет Тп



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки, покрытые оболочкой** зеленого цвета, с полуматовой поверхностью, круглые, двояковыпуклый формой.

	1 таб.
сухой экстракт корня первоцвета (6.0-7.0:1) (экстрагент: этанол 47.4 % в объемном отношении)	60 мг
сухой экстракт травы тимьяна (5.9-10.0:1) (экстрагент: этанол 70 % в объемном отношении)	160 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 50 мг, декстрозы сироп 34 мг, поли (1-винил-2-пирролидон) 5 мг, поли (1-винил-2-пирролидон) со связью через открытое кольцо 10 мг, кремния диоксид коллоидный 21 мг, целлюлоза микрокристаллическая 54 мг, магния стеарат 2 мг, тальк 4 мг.

Состав пленочной оболочки: диоксид титана 2 мг, тальк 2.585 мг, хлорофилла порошок 0.2 мг, рибофлавин 0.2 мг, пропиленгликоль 1.363 мг, гипромеллоза 9.834 мг, метилметакрилата и этилакрилата сополимер 2:1.8 5.76 мг, диметикон 0.058 мг, мятный ароматизатор 1 мг, натрия сахаринат 0.1 мг

20 шт. - блистеры (1) - коробки картонные.
20 шт. - блистеры (5) - коробки картонные.
25 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.
25 шт. - блистеры (4) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Отхаркивающее средство растительного происхождения. Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, секретолитическое, бронхолитическое действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего средства при лечении острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты (трахеит, трахеобронхит, бронхит).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)

- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата (в т.ч. к первоцвету и тимьяну, а также к другим растениям рода первоцвет и/или семейства губоцветные);
- заболевания ЖКТ (в стадии обострения);
- непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (из-за содержания в препарате лактозы моногидрата и декстрозы сиропа);
- детский возраст до 12 лет (в связи с отсутствием клинических данных).

Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым и детям старше 12 лет** по 1 таб. 3 раза/сут до еды. Таблетки следует проглатывать, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. В среднем курс лечения - 10-14 дней.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции, обусловленные повышенной чувствительностью к компонентам препарата: например одышка, кожные высыпания, крапивница, отеки лица, ротовой полости и/или глотки. В случае появления первых признаков аллергической реакции следует прекратить прием препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Со стороны ЖКТ: в редких случаях тошнота, рвота, диарея, спастические боли.

Передозировка:

При передозировке возможны боли в области желудка, рвота, диарея.

В случае передозировки необходимо провести симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не следует применять во время беременности и кормления грудью

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Бронхипрет ТП не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Возможна комбинация с антибактериальными лекарственными средствами

Особые указания и меры предосторожности:

Если при применении препарата в течение 7 дней симптомы заболевания сохраняются или состояние больного ухудшается, следует обратиться за консультацией к врачу.

Препарат может назначаться больным сахарным диабетом, т.к. 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит менее 0.03 учитываемых хлебных единиц.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bronhipret_Tp