Бронхипрет (капли)



Код АТХ:

- R05CA10

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Плюща листьев экстракт
- Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Сироп. Во флаконах темного стекла, 50 или 100 мл. 1 фл. с дозирующим капельным устройством, навинчивающейся крышкой, предохранительным кольцом и мерным стаканчиком сверху в складной картонной пачке.

Состав:

Сироп	100 г
активные вещества:	
жидкий экстракт травы тимьяна *(Thymus vulgaris)* (1:2–2,5; экстрагирующее вещество по DAB 10)	15 г
жидкий экстракт листьев плюща *(Hedera helix)* (1:1; экстрагирующее вещество: этанол 70 об.%)	1,5 г
содержание этанола — 7 об.%	
вспомогательные вещества: сироп мальтитный; калия сорбат; лимонной кислоты моногидрат; вода очищенная	

Описание:

Прозрачная ароматная жидкость светло-коричневого цвета.

Возможно выпадение незначительного осадка в процессе хранения.

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — бронхолитическое, секретолитическое, противовоспалительное, отхаркивающее.

Фармакодинамика

Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, секретолитическое, бронхолитическое действие; способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

Показания к применению:

В качестве отхаркивающего средства при лечении острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты (трахеит, трахеобронхит, бронхит).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

Детский возраст до 3 месяцев (сироп); детский возраст до 6 лет (капли); алкоголизм, эпилепсия, заболевания печени, заболеваниях и травмы головного мозга (вследствие наличия этанола); повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Режим дозирования индивидуальный, в зависимости от показаний, возраста пациента и клинической ситуации.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: возможны боли в области желудка, рвота, диарея.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Диагнозы

- Астматический статус
- Бронхиальная астма
- Бронхит
- Муковисцидоз

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует применять одновременно с *противокашлевыми препаратами*, а также с лекарственными средствами,

уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Возможно одновременное применение препарата с *антибактериальными* средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Если при применении препарата в течение 10-14 дней симптомы заболевания сохраняются, пациенту следует обратиться за консультацией к врачу.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bronhipret_kapli