Бронхитусен Врамед



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Сироп в виде вязкой жидкости, от светло-желтого до желто-зеленого или светло-коричневого цвета, от прозрачной до слабо опалесцирующей, со специфическим запахом базиликового масла.

	5 мл
глауцина гидробромид	5 мг
эфедрина гидрохлорид	4 мг

Вспомогательные вещества: масло базилика, лимонной кислоты ангидрид, сахароза, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, полисорбат 80, этанол 96% (1.7 об.%), вода очищенная.

125 г - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложкой или стаканчиком - пачки картонные.
125 г - флаконы из темного полиэтилентерефталата (1) в комплекте с мерной ложкой или стаканчиком - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с противокашлевым и бронхолитическим действием.

Глауцин - противокашлевое средство центрального действия, угнетает кашлевой центр, но не оказывает угнетающего действия на дыхательный центр.

Эфедрин - симпатомиметическое средство, оказывает бронхорасширяющее действие, уменьшает отечность слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

Эфирное масло базилика обладает легким седативным и антисептическим действием, угнетает кашлевой рефлекс.

Показания к применению:

Респираторные заболевания у взрослых и детей старше 3 лет:

— острые и хронические трахеобронхиты и бронхиты;

— бронхиальная астма;

— коклюш.

Относится к болезням:

- Астма
- Бронхит
- Коклюш
- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства;

— стенокардия;

— атеросклероз;

— сердечная недостаточность;

— артериальная гипертензия;

— аритмии;

— глаукома;

— сахарный диабет;

— тиреотоксикоз;

— аденома предстательной железы;

— бессонница;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Для **взрослых** - по 1 столовой ложке 3-4 раза/сут; для **детей старше 3 лет и до 10 лет** - по 1 чайной ложке 3 раза/сут; **для детей старше 10 лет** - по 2 чайных ложки 3 раза/сут.

Побочное действие:

Препарат повышает ЧСС и АД, угнетает кишечную перистальтику, расширяет зрачки, стимулирует ЦНС (психическое и двигательное беспокойство), уменьшает аппетит.

У детей возможна сонливость.

Передозировка:

При передозировке возможно появление тошноты, рвоты, возбуждения ЦНС, бессонница, потеря аппетита.

Лечение: промывание желудка, затем симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактаци (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Комбинированное лечение:

— с инсулином и пероральными гипогликемическими средствами может уменьшить действие противодиабетических препаратов;

— с гуанетидином (антигипертензивное средство) повышает риск возникновения нарушений сердечного ритма;

— с ингибиторами МАО, антидепрессантами - возможны аритмия, головная боль, гипертензивный криз, острое нарушение мозгового кровообращения.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Для **детей старше 3 лет и до 10 лет** - по 1 чайной ложке 3 раза/сут; **для детей старше 10 лет** - по 2 чайных ложки 3 раза/сут.

Условия хранения:

В местах, защищенных от света и недоступных для детей, при температуре 15-30°С.

Не использовать позже срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bronhitusen_Vramed