

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуностимулирующий препарат бактериального происхождения. Бронхо-Ваксом взрослый стимулирует иммунную защиту организма и увеличивает сопротивляемость к инфекциям дыхательной системы. Иммунофармакологические исследования показали, что Бронхо-Ваксом взрослый обладает следующим действием: увеличивает образование иммуноглобулинов А (IgA), секретируемых слизистой оболочкой дыхательных путей и слюной; увеличивает количество циркулирующих Т-лимфоцитов.

Клинически Бронхо-Ваксом взрослый уменьшает частоту острых инфекций дыхательных путей, сокращает продолжительность их течения, а также снижает вероятность обострения хронического бронхита. При этом снижается потребность применения других лекарственных препаратов, особенно антибиотиков.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Бронхо-Ваксом взрослый не предоставлены.

Показания к применению:

Взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше:

- профилактика рецидивирующей инфекции дыхательных путей и обострений хронического бронхита;
- лечение острых инфекций дыхательных путей (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Бронхо-Ваксом взрослый назначают **взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше**.

С целью *лечения*: по 1 капсуле препарата Бронхо-Ваксом взрослый ежедневно утром натощак до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней. При необходимости проведения антибиотикотерапии Бронхо-Ваксом взрослый следует принимать в сочетании с антибиотиком с начала лечения.

Длительность лечения или назначение повторного курса терапии должен определять врач, исходя из состояния здоровья пациента.

С целью *профилактики обострений и поддерживающей терапии*: 1 капсула препарата Бронхо-Ваксом взрослый ежедневно утром натощак. Курс включает 3 цикла, каждый из которых состоит из ежедневного приема 1 капсулы в течение 10 дней, интервал между циклами 20 дней.

В случае если капсулу трудно проглотить, ее следует открыть и смешать содержимое с питьем (в т.ч. с фруктовым соком, молоком).

Побочное действие:

Бронхо-Ваксом взрослый обычно хорошо переносится. Результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что частота слабо выраженных побочных реакций составляет 3-4%.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боль в животе, рвота.

Дерматологические реакции: зуд, эритема.

Со стороны дыхательной системы: кашель, одышка.

Со стороны нервной системы: головная боль, чувство усталости.

В случае продолжающихся желудочно-кишечных расстройств, кожных реакций и респираторных проявлений следует прекратить прием препарата, поскольку они могут являться аллергическими реакциями. В такой ситуации пациент должен проконсультироваться с лечащим врачом.

Передозировка:

Сведения о случаях передозировки отсутствуют. Природа препарата Бронхо-Ваксом взрослый и результаты изучения его токсичности указывают на то, что передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Бронхо-Ваксом взрослый при беременности и в период лактации возможно в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Клинических исследований применения препарата у беременных женщин не проводилось.

В отношении безопасности применения препарата в период грудного вскармливания специальных исследований не проводилось, в настоящее время данных не имеется.

В экспериментальных исследованиях на животных не выявлено отрицательного воздействия на течение беременности, развитие эмбриона, плода и/или постнатальное развитие.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Бронхо-Ваксом взрослый можно применять одновременно с другими лекарственными препаратами для терапии острых и хронических респираторных заболеваний.

Взаимодействие препарата Бронхо-Ваксом взрослый с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Соблюдения мер предосторожности при применении препарата не требуется.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Бронхо-Ваксом взрослый не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 6 мес.

Детям в возрасте от 6 месяцев до 12 лет следует использовать препарат Бронхо-Ваксом детский.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bronho-Vaksom_Vzroslyy