# Бронхо-Ваксом взрослый




## Код АТХ:

- L03A

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Klebsiella ozaenae
- Klebsiella pneumoniae
- Moraxella catarrhalis
- Staphylococcus aureus
- Streptococcus pneumoniae
- Streptococcus pyogenes
- Streptococcus viridans
- Haemophilus influenzae

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН] Википедия[МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Капсулы*** твердые желатиновые, размер №3, крышечка и корпус голубые непрозрачные; содержимое капсул - порошок светло-бежевого цвета.

| | **1 капс.** |
|---|---|
| стандартизированный лиофилизат бактериальных лизатов: | |
| Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis | 7 мг |

*Вспомогательные вещества:* пропилгаллат безводный (Е310) - 0.084 мг, мононатрия глутамат (соответствует безводному натрия глутамату (натрия глютамату)) - 3.03 мг, маннитол - необходимое количество до 40 мг, крахмал прежелатинизированный - 110 мг, магния стеарат - 3 мг, маннитол - необходимое количество до 200 мг.

*Состав оболочки капсулы:* индигокармин (индиготин) (краситель Е132) - 0.03 мг, титана диоксид (краситель Е171) - 1 мг, желатин - необходимое количество до 50 мг.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Иммуностимулирующий препарат бактериального происхождения. Бронхо-Ваксом взрослый стимулирует иммунную защиту организма и увеличивает сопротивляемость к инфекциям дыхательной системы. Иммунофармакологические исследования показали, что Бронхо-Ваксом взрослый обладает следующим действием: увеличивает образование иммуноглобулинов А (IgA), секретируемых слизистой оболочкой дыхательных путей и слюной; увеличивает количество циркулирующих Т-лимфоцитов.

Клинически Бронхо-Ваксом взрослый уменьшает частоту острых инфекций дыхательных путей, сокращает продолжительность их течения, а также снижает вероятность обострения хронического бронхита. При этом снижается потребность применения других лекарственных препаратов, особенно антибиотиков.

***Фармакокинетика***

Данные о фармакокинетике препарата Бронхо-Ваксом взрослый не предоставлены.

## Показания к применению:

Взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше:

— профилактика рецидивирующей инфекции дыхательных путей и обострений хронического бронхита;

— лечение острых инфекций дыхательных путей (в составе комплексной терапии).

## Относится к болезням:

- Бронхит
- Инфекции

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Бронхо-Ваксом взрослый назначают **взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше**.

С целью *лечения:* по 1 капсуле препарата Бронхо-Ваксом взрослый ежедневно утром натощак до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней. При необходимости проведения антибиотикотерапии Бронхо-Ваксом взрослый следует принимать в сочетании с антибиотиком с начала лечения.

Длительность лечения или назначение повторного курса терапии должен определять врач, исходя из состояния здоровья пациента.

С целью *профилактики обострений и поддерживающей терапии:* 1 капсула препарата Бронхо-Ваксом взрослый ежедневно утром натощак. Курс включает 3 цикла, каждый из которых состоит из ежедневного приема 1 капсулы в течение 10 дней, интервал между циклами 20 дней.

В случае если капсулу трудно проглотить, ее следует открыть и смешать содержимое с питьем (в т.ч. с фруктовым соком, молоком).

## Побочное действие:

Бронхо-Ваксом взрослый обычно хорошо переносится. Результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что частота слабо выраженных побочных реакций составляет 3-4%.

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, боль в животе, рвота.

*Дерматологические реакции:* зуд, эритема.

*Со стороны дыхательной системы:* кашель, одышка.

*Со стороны нервной системы:* головная боль, чувство усталости.

В случае продолжающихся желудочно-кишечных расстройств, кожных реакций и респираторных проявлений следует прекратить прием препарата, поскольку они могут являться аллергическими реакциями. В такой ситуации пациент должен проконсультироваться с лечащим врачом.

## Передозировка:

Сведения о случаях передозировки отсутствуют. Природа препарата Бронхо-Ваксом взрослый и результаты изучения его токсичности указывают на то, что передозировка маловероятна.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Бронхо-Ваксом взрослый при беременности и в период лактации возможно в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Клинических исследований применения препарата у беременных женщин не проводилось.

В отношении безопасности применения препарата в период грудного вскармливания специальных исследований не проводилось, в настоящее время данных не имеется.

В *экспериментальных исследованиях* на животных не выявлено отрицательного воздействия на течение беременности, развитие эмбриона, плода и/или постнатальное развитие.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Бронхо-Ваксом взрослый можно применять одновременно с другими лекарственными препаратами для терапии острых и хронических респираторных заболеваний.

Взаимодействие препарата Бронхо-Ваксом взрослый с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не установлено.

## Особые указания и меры предосторожности:

Соблюдения мер предосторожности при применении препарата не требуется.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Бронхо-Ваксом взрослый не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан детям до 6 мес.

**Детям в возрасте от 6 месяцев до 12 лет** следует использовать препарат Бронхо-Ваксом детский.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

## Срок годности:

5 лет.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Bronho-Vaksom_vzroslyy