# Бронхобос

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Карбоцистеин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Сироп 2.5%*** прозрачный, слегка вязкий, с запахом и цветом малины.

| | **5 мл (1 мерн. ложка)** |
|---|---|
| карбоцистеин | 125 мг |

*Вспомогательные вещества:* глицерол, этанол 96%, натрия гидроксид, натрия карбоксиметилцеллюлоза, метилпарагидроксибензоат, лимонная кислота, натрия сахарин, пропилпарагидроксибензоат, малиновый ароматизатор, азорубин CL 14720, вода дистиллированная.

200 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложечкой - пачки картонные.

◊ ***Сироп 5%*** прозрачный, слегка вязкий, с запахом и цветом малины.

| | **5 мл (1 мерн. ложка)** |
|---|---|
| карбоцистеин | 250 мг |

*Вспомогательные вещества:* глицерол, этанол 96%, натрия гидроксид, натрия карбоксиметилцеллюлоза, метилпарагидроксибензоат, лимонная кислота, натрия сахарин, пропилпарагидроксибензоат, малиновый ароматизатор, азорубин CL 14720, вода дистиллированная.

200 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложечкой - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Муколитический препарат. Действие препарата обусловлено активацией сиаловой трансферазы - фермента

бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов. Нормализует количественное соотношение кислых и нейтральных сиаломуцинов бронхиального секрета, восстанавливает вязкость и эластичность слизи. Способствует регенерации слизистой оболочки, нормализует ее структуру, активизирует деятельность реснитчатого эпителия. Восстанавливает секрецию иммунологически активного IgA (специфическая защита) и количество сульфгидрильных групп компонентов слизи (неспецифическая защита), улучшает мукоцилиарный клиренс.

## Показания к применению:

— острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся нарушением образования и выведения слизи;

— воспалительные заболевания среднего уха;

— воспалительные заболевания придаточных пазух носа;

— подготовка больного к бронхоскопии или бронхографии.

## Относится к болезням:

- Бронхит

## Противопоказания:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;

— острый гломерулонефрит;

— острый цистит;

— детский возраст до 2 лет;

— беременность;

— лактация (грудное вскармливание);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь.

| Возраст | Сироп 5% | Сироп 2.5% | Кратность приема |
|---|---|---|---|
| Взрослые | 15 мл (3 мерные ложки) | - | 3 раза/сут |
| Детям в возрасте 4-12 лет | 5 мл (1 мерная ложка) | 10 мл (2 мерные ложки) | 3 раза/сут |
| Детям в возрасте 2-4 лет | 2.5-5 мл (1/2-1 мерная ложка) | - | 2 раза/сут |
| | - | 5 мл (1 мерная ложка) | 2-4 раза/сут |

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастрии.

*Аллергические реакции:* в единичных случаях - зуд, крапивница, экзантема.

У пациентов с бронхиальной астмой и у пожилых пациентов возможно появление обструкции дыхательных путей. Редко отмечается головная боль.

При развитии побочных эффектов рекомендуется уменьшить дозу или прекратить прием препарата.

## Передозировка:

Случаи интоксикации неизвестны (даже при приеме препарата в очень высоких дозах).

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарат потенцирует бронхолитический эффект теофиллина.

Активность карбоцистеина ослабляют противокашлевые и атропиноподобные препараты.

При одновременном применении повышает эффективность терапии ГКС и антибактериальной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний верхних и нижних отделов дыхательных путей.

## Особые указания и меры предосторожности:

У пациентов с язвенной болезнью в анамнезе доза препарата должна быть снижена.

***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан детям до 2 лет.

| Возраст | Сироп 5% | Сироп 2.5% | Кратность приема |
|---|---|---|---|
| Детям в возрасте 4-12 лет | 5 мл (1 мерная ложка) | 10 мл<br>(2 мерные ложки) | 3 раза/сут |
| Детям в возрасте 2-4 лет | 2.5-5 мл<br>(1/2-1 мерная ложка) | - | 2 раза/сут |
| | - | 5 мл (1 мерная ложка) | 2-4 раза/сут |

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С; не замораживать. Срок годности указан на упаковке.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Bronhobos