

Бронхобос



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Карбоцистеин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Сироп 2.5%** прозрачный, слегка вязкий, с запахом и цветом малины.

	5 мл (1 мерн. ложка)
карбоцистеин	125 мг

Вспомогательные вещества: глицерол, этанол 96%, натрия гидроксид, натрия карбоксиметилцеллюлоза, метилпарагидроксибензоат, лимонная кислота, натрия сахарин, пропилпарагидроксибензоат, малиновый ароматизатор, азорубин CL 14720, вода дистиллированная.

200 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложечкой - пачки картонные.

♦ **Сироп 5%** прозрачный, слегка вязкий, с запахом и цветом малины.

	5 мл (1 мерн. ложка)
карбоцистеин	250 мг

Вспомогательные вещества: глицерол, этанол 96%, натрия гидроксид, натрия карбоксиметилцеллюлоза, метилпарагидроксибензоат, лимонная кислота, натрия сахарин, пропилпарагидроксибензоат, малиновый ароматизатор, азорубин CL 14720, вода дистиллированная.

200 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложечкой - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Муколитический препарат. Действие препарата обусловлено активацией сиаловой трансферазы - фермента

бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов. Нормализует количественное соотношение кислых и нейтральных сиаломуцинов бронхиального секрета, восстанавливает вязкость и эластичность слизи. Способствует регенерации слизистой оболочки, нормализует ее структуру, активизирует деятельность реснитчатого эпителия. Восстанавливает секрецию иммунологически активного IgA (специфическая защита) и количество сульфгидрильных групп компонентов слизи (неспецифическая защита), улучшает мукоцилиарный клиренс.

Показания к применению:

- острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся нарушением образования и выведения слизи;
- воспалительные заболевания среднего уха;
- воспалительные заболевания придаточных пазух носа;
- подготовка больного к бронхоскопии или бронхографии.

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)

Противопоказания:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- острый гломерулонефрит;
- острый цистит;
- детский возраст до 2 лет;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь.

Возраст	Сироп 5%	Сироп 2.5%	Кратность приема
Взрослые	15 мл (3 мерные ложки)	-	3 раза/сут
Детям в возрасте 4-12 лет	5 мл (1 мерная ложка)	10 мл (2 мерные ложки)	3 раза/сут
Детям в возрасте 2-4 лет	2.5-5 мл (1/2-1 мерная ложка)	-	2 раза/сут
	-	5 мл (1 мерная ложка)	2-4 раза/сут

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастрии.

Аллергические реакции: в единичных случаях - зуд, крапивница, экзантема.

У пациентов с бронхиальной астмой и у пожилых пациентов возможно появление обструкции дыхательных путей. Редко отмечается головная боль.

При развитии побочных эффектов рекомендуется уменьшить дозу или прекратить прием препарата.

Передозировка:

Случаи интоксикации неизвестны (даже при приеме препарата в очень высоких дозах).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарат потенцирует бронхолитический эффект теофиллина.

Активность карбоцистеина ослабляют противокашлевые и атропиноподобные препараты.

При одновременном применении повышает эффективность терапии ГКС и антибактериальной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний верхних и нижних отделов дыхательных путей.

Особые указания и меры предосторожности:

У пациентов с язвенной болезнью в анамнезе доза препарата должна быть снижена.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 2 лет.

Возраст	Сироп 5%	Сироп 2.5%	Кратность приема
Детям в возрасте 4-12 лет	5 мл (1 мерная ложка)	10 мл (2 мерные ложки)	3 раза/сут
Детям в возрасте 2-4 лет	2.5-5 мл (1/2-1 мерная ложка)	-	2 раза/сут
	-	5 мл (1 мерная ложка)	2-4 раза/сут

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C; не замораживать. Срок годности указан на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bronhobos>