

## [Бронхобос \(капсулы\)](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Карбоцистеин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Капсулы** твердые желатиновые, размер №0, непрозрачные, желтого цвета; содержимое капсул - белый порошок.

	<b>1 капс.</b>
карбоцистеин	375 мг

*Вспомогательные вещества:* крахмал кукурузный, желатин, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Отхаркивающий (муколитический) препарат. Муколитическое и отхаркивающее действие обусловлено активацией сиаловой трансферазы - фермента бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов. Нормализует количественное соотношение кислот и нейтральных сиаломуцинов бронхиального секрета, восстанавливает вязкость и эластичность слизи. Способствует регенерации слизистой оболочки, нормализует ее структуру, активизирует деятельность реснитчатого эпителия. Восстанавливает секрецию иммунологически активного IgA (специфическая защита) и количество сульфгидрильных групп компонентов слизи (неспецифическая защита), улучшает мукоцилиарный клиренс.

#### **Фармакокинетика**

$C_{max}$  в сыворотке крови и в слизистой оболочке дыхательных путей достигается через 2-3 ч после приема внутрь и сохраняется в слизистой оболочке в течение 8 ч.

## Бронхобос (капсулы)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Выводится преимущественно с мочой, частично в неизменном виде, частично в виде метаболитов.

### Показания к применению:

— острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся образованием вязкой, трудноотделяемой мокроты (трахеит, бронхит, трахеобронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) и слизи (воспалительные заболевания среднего уха, носа и его придаточных пазух - ринит, средний отит, синусит);

— подготовка к бронхоскопии и/или бронхографии.

### Относится к болезням:

- [Астма](#)
- [Бронхит](#)
- [Бронхоэктатическая болезнь](#)
- [Отит](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

### Противопоказания:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии

— обострения;

— хронический гломерулонефрит (в фазе обострения), цистит;

— детский возраст до 15 лет;

— беременность ( I триместр);

— повышенная чувствительность к карбоцистеину или другим компонентам препарата.

Следует соблюдать *осторожность* при приеме препарата при хроническом гломерулонефрите (в анамнезе), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (в анамнезе).

### Способ применения и дозы:

Для приема внутрь.

**Взрослым:** по 2 капсул. 3 раза/сут.

После достижения эффекта суточную дозу снижают до 1.5 г (по 2 капсул. 2 раза/сут). Лечение не должно продолжаться более 8-10 дней без консультации с врачом.

### Побочное действие:

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* иногда отмечаются тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастрии, желудочно-кишечное кровотечение.

Отмечены *единичные случаи* аллергических реакций (зуд, крапивница, экзантема, ангиопевротический отек).

Головокружение, слабость, недомогание.

### Передозировка:

*Симптомы:* гастралгия, тошнота, диарея.

*Лечение:* симптоматическое.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан в I триместре беременности.

Следует соблюдать осторожность при беременности (II - III триместр) и во время кормления грудью.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Повышает эффективность глюкокортикостероидной (взаимно) и антибактериальной терапии воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.

Усиливает бронхолитический эффект теофиллина.

Активность карбоцистеина ослабляют противокашлевые и атропиноподобные средства.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

У пациентов с язвенной болезнью в анамнезе доза препарата должна быть снижена. Лечение можно сочетать с физиотерапевтическими процедурами.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано: детский возраст до 15 лет.

## **Условия хранения:**

При температуре от 15 до 30 °С, в недоступном для детей месте. Срок годности - 3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Bronhobos\\_kapsuly](http://drugs.thead.ru/Bronhobos_kapsuly)