

Бронхофит



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Эликсир** в виде прозрачной или слегка опалесцирующей жидкости коричневого цвета с ароматным запахом; допускается образование осадка.

	1 л
водно-спиртовое извлечение "Бронхофит" с содержанием глицирризиновой кислоты не менее 0.03% (в т. ч.: солодки корни - 10 г, подорожника большого листья - 8 г, шалфея листья - 5 г, аниса обыкновенного плоды - 4.4 г, чабреца трава - 4.2 г, багульника болотного побеги - 4 г, фиалки трава - 4 г, колер эликсирный - 30 г, лимонная кислота пищевая - 0.48 г, сахароза - 40 г, этанол 95% - 84 мл, вода очищенная - до 1000 мл)	39.6 г

100 мл - бутылки стеклянные (1) - пачки картонные.

200 мл - бутылки стеклянные (1) - пачки картонные.

250 мл - бутылки стеклянные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает отхаркивающее и умеренно противовоспалительное действие.

Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся сниженной дренажной функцией бронхов и повышенной вязкостью мокроты.

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

- период беременности, грудного вскармливания;
- заболевания печени и почек;
- детский возраст (до 18 лет).

С осторожностью: панкреатит, нарушения углеводного обмена (сахарный диабет и др.).

Способ применения и дозы:

Препарат применяют у взрослых внутрь по 2-3 чайные ложки (10-15 мл), разведенных в 1/4 - 1/3 стакана воды, 2-3 раза в день за 10-15 мин до еды. Курс лечения 2-3 недели. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Разовая доза препарата (10-15 мл) содержит около 0,5 г сахарозы, что соответствует 0,05 ХЕ, что следует учитывать больным сахарным диабетом. Препарат содержит 25-28 % этилового спирта; в разовой дозе (10-15 мл) содержится от 2 до 3,4 г этанола.

При нарушениях функции почек

Противопоказано при заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказано при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°C. В недоступном для детей месте.

Срок годности:

Бронхофит

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bronhofit>