Бронхоплант

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Сироп*** коричневого цвета с характерным запахом.

	1 фл.
жидкий экстракт травы тимьяна обыкновенного (с содержанием тимола 0.028%)	9 г

Вспомогательные вещества: калия сорбат - 0.1 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.08 г, колер карамельный - 0.2 г, глицерол - 17 г, сорбитол жидкий (некристаллизующийся) - 45 г, вода очищенная - 28.62 г.

100 мл - флаконы коричневого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Бактерицидный и фунгицидный эффекты связаны с компонентами эфирного масла, в т.ч. с тимолом, карвакролом, борнеолом, пиненом, урсоловой кислотой. Проявляет выраженные отхаркивающий, муколитический и бронхолитический эффекты, уменьшает отек и воспаление слизистой оболочки бронхов, активизирует иммунную систему. Антигипоксическая активность выражена умеренно и связана с линалоолом, гераниолом, оксикоричной кислотой, флавоноидами (гликозидами лютеолина, апигенина), магнием и селеном. Фенольные соединения раздражают слизистую оболочку ЖКТ, увеличивают секрецию пищеварительных желез, оказывают карминативное и мочегонное действие. Повышение АД обусловлено действием тимола, эффект развивается постепенно, сохраняется длительное время, проявляется только у лиц с артериальной гипотензией.

Благодаря седативному, обезболивающему и мягкому утеротоническому действию эффективен при альгоменорее, дисменорее.

При наружном применении препараты тимьяна наряду с противомикробным действием оказывают противозудный и обезболивающий эффекты.

Показания к применению:

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания, стоматиты, гингивиты, синуситы, гайморит; бронхиальная астма; коклюш; нейроциркуляторная дистония по гипотензивному типу; гинекологические заболевания, альгоменорея, дисменорея; хронические гастриты с пониженной секрецией, энтероколиты, ферментопатии, дискинезии ЖКТ, дисбактериоз; дерматиты, невриты, радикулиты, миозиты, артралгии.

Относится к болезням:

- Артралгия
- Артрит
- Артроз
- Астма
- Бронхиальная астма
- Бронхит
- Гайморит
- Гастрит
- Гингивит
- Гипотензия
- Дерматит
- Дисбактериоз
- Дисменорея
- Инфекции
- Коклюш
- Неврит
- Нейроциркуляторная дистония
- Радикулит
- Синусит
- Стоматит
- Энтерит

Противопоказания:

Для приема внутрь: гастриты с повышенной секрецией.

Повышенная чувствительность к тимьяну.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь в виде приготовленного настоя травы по 50-100 мл в теплом виде 2-4 раза/сут после еды; при заболеваниях ЖКТ - за 15-30 мин до еды. В виде готовых лекарственных форм применяется в соответствующем режиме дозирования.

Наружно может быть использован в виде ванн.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции. При передозировке - тошнота.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препараты тимьяна в высоких дозах не рекомендуется применять при беременности из-за угрозы выкидыша.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

Источник: http://drugs.thead.ru/Bronhoplant