Бронхосан



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь*** в виде прозрачной, от бесцветного до светло-желтого цвета жидкости с ментоловым запахом.

	1 г
бромгексина гидрохлорид	8 мг
левоментол	1.5 мг
масло фенхеля	750 мкг
масло анисовое	250 мкг
масло душицы	250 мкг
масло мяты перечной	250 мкг
масло эвкалиптовое	250 мкг

Вспомогательные вещества: калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат, хлористоводородная кислота 35%, сахароза, триэтиленгликоль, полисорбат 80, этанол 96%, вода очищенная.

25 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает муколитическое, отхаркивающее, спазмолитическое и противомикробное действие.

Показания к применению:

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости:

— трахеобронхит;

— обструктивный бронхит;

— эмфизема легких;

— бронхоэктатическая болезнь;

— бронхиальная астма;

— пневмокониоз;

— муковисцидоз.

Относится к болезням:

- Астма
- Бронхиальная астма
- Бронхит
- Бронхоэктатическая болезнь
- Муковисцидоз
- Пневмокониоз
- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст до 3 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: при заболеваниях печени, алкоголизме, эпилепсии, хронической почечной недостаточности.

Способ применения и дозы:

Внутрь. **Взрослым** и **детям старше 12 лет:** 20 капель 4 раза/сут. **Детям от 6 до 12 лет:** 15 капель 4 раза/сут. **Детям от 3 до 6 лет:** 10 капель 4 раза/сут.

Препарат принимают до или после еды в небольшом объеме жидкости или на кусочке сахара, запивая достаточным объемом жидкости. Муколитическое действие Бронхосана усиливается при употреблении большого количества жидкости.

Продолжительность лечения зависит от клинического проявления заболевания.

При **тяжелых расстройствах функции почек** необходимо уменьшить дозы или увеличить интервал между приемом отдельных доз.

1 мл препарата содержит 25 капель.

Побочное действие:

Препарат обычно хорошо переносится, но возможны побочные действия:

Редко - тошнота, рвота, диспептические расстройства.

В отдельных случаях — обратимое повышение активности печеночных трансаминаз в сыворотке крови, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, аллергические реакции (в литературе крайне редко сообщается о случаях острых тяжелых реакций анафилактического типа вплоть до развития анафилактического шока).

Передозировка:

В случае передозировки возможно усиление вышеуказанных побочных действий.

Лечение: промывание желудка с последующим приемом внутрь активированного угля; симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Бромгексин, входящий в состав Бронхосана, улучшает проникновение некоторых антибиотиков (окситетрациклин, эритромицин, цефалексин) в легочную ткань.

Не рекомендуется назначать Бронхосан с препаратами, содержащими кодеин и другими противокашлевыми средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Бронхосан содержит 36% раствор этанола.

При нарушениях функции почек

При **тяжелых расстройствах функции почек** необходимо уменьшить дозы или увеличить интервал между приемом отдельных доз.

При нарушениях функции печени

С осторожностью: при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 3 лет.

Условия хранения:

При температуре 15-25°С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bronhosan