

## Бронхосан



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь** в виде прозрачной, от бесцветного до светло-желтого цвета жидкости с ментоловым запахом.

	<b>1 г</b>
бромгексина гидрохлорид	8 мг
левоментол	1.5 мг
масло фенхеля	750 мкг
масло анисовое	250 мкг
масло душицы	250 мкг
масло мяты перечной	250 мкг
масло эвкалиптовое	250 мкг

*Вспомогательные вещества:* калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат, хлористоводородная кислота 35%, сахараза, триэтиленгликоль, полисорбат 80, этанол 96%, вода очищенная.

25 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает муколитическое, отхаркивающее, спазмолитическое и противомикробное действие.

### Показания к применению:

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости:

- трахеобронхит;
- обструктивный бронхит;
- эмфизема легких;
- бронхоэктатическая болезнь;
- бронхиальная астма;

— пневмокониоз;

— муковисцидоз.

### Относится к болезням:

- [Астма](#)
- [Бронхиальная астма](#)
- [Бронхит](#)
- [Бронхоэктатическая болезнь](#)
- [Муковисцидоз](#)
- [Пневмокониоз](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

### Противопоказания:

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст до 3 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью:* при заболеваниях печени, алкоголизме, эпилепсии, хронической почечной недостаточности.

### Способ применения и дозы:

Внутрь. **Взрослым и детям старше 12 лет:** 20 капель 4 раза/сут. **Детям от 6 до 12 лет:** 15 капель 4 раза/сут. **Детям от 3 до 6 лет:** 10 капель 4 раза/сут.

Препарат принимают до или после еды в небольшом объеме жидкости или на кусочке сахара, запивая достаточным объемом жидкости. Муколитическое действие Бронхосана усиливается при употреблении большого количества жидкости.

Продолжительность лечения зависит от клинического проявления заболевания.

При **тяжелых расстройствах функции почек** необходимо уменьшить дозы или увеличить интервал между приемом отдельных доз.

1 мл препарата содержит 25 капель.

### Побочное действие:

Препарат обычно хорошо переносится, но возможны побочные действия:

*Редко* - тошнота, рвота, диспептические расстройства.

*В отдельных случаях* — обратимое повышение активности печеночных трансаминаз в сыворотке крови, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, аллергические реакции (в литературе крайне редко сообщается о случаях острых тяжелых реакций анафилактического типа вплоть до развития анафилактического шока).

### Передозировка:

В случае передозировки возможно усиление вышеуказанных побочных действий.

*Лечение:* промывание желудка с последующим приемом внутрь активированного угля; симптоматическое лечение.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

---

Противопоказан при беременности и в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Бромгексин, входящий в состав Бронхосана, улучшает проникновение некоторых антибиотиков (окситетрациклин, эритромицин, цефалексин) в легочную ткань.

Не рекомендуется назначать Бронхосан с препаратами, содержащими кодеин и другими противокашлевыми средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Бронхосан содержит 36% раствор этанола.

### ***При нарушениях функции почек***

При **тяжелых расстройствах функции почек** необходимо уменьшить дозы или увеличить интервал между приемом отдельных доз.

### ***При нарушениях функции печени***

*С осторожностью:* при заболеваниях печени.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст до 3 лет.

## **Условия хранения:**

При температуре 15-25°C в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Bronhosan>