Бронхотон



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Глауцин
- Эфедрин
- Базилика обыкновенного масло

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает противокашлевое и бронходилатирующее действие.

Глауцина гидробромид подавляет кашлевой центр, не приводя, однако, к угнетению дыхания, развитию запоров и лекарственной зависимости.

Эфедрин стимулирует дыхание, расширяет бронхи и (за счет сосудосуживающего действия) устраняет отек слизистой оболочки бронхов.

Базиликовое масло оказывает седативное (слабое), противомикробное и спазмолитическое действие.

Показания к применению:

Сухой кашель:

— бронхит;

— трахеобронхит;

— ХОБЛ;

— бронхиальная астма;

— коклюш;

— бронхопневмония.

Относится к болезням:

- Астма
- Бронхиальная астма
- Бронхит
- Бронхопневмония
- Кашель
- Коклюш
- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— коронарный атеросклероз;

— стенокардия;

— тиреотоксикоз;

— артериальная гипертензия;

— бессонница;

— хроническая сердечная недостаточность;

— феохромоцитома;

— закрытоугольная глаукома;

— гипертрофия предстательной железы (в случае наличия остаточной мочи);

— детский возраст (до 3 лет).

С *осторожностью*: больным, склонным к развитию лекарственной зависимости.

Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым** - по 1 ст.л. (15 мл) 3-4 раза/сут. **Детям старше 3 лет** - 1 ч.л. (5 мл) 3 раза/сут, **детям старше 10 лет** - 2 ч.л. 3 раза/сут.

Побочное действие:

Повышение АД, тахикардия, тошнота, головокружение.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, снижение аппетита, возбуждение, тремор конечностей, нарушение кровообращения, головокружение, задержка мочи.

Лечение: промывание желудка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Снижает гипотензивное действие симпатолитиков.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 3 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bronhoton