

Бронхотон



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Глауцин](#)
- [Эфедрин](#)
- [Базилика обыкновенного масла](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает противокашлевое и бронходилатирующее действие.

Глауцина гидробромид подавляет кашлевой центр, не приводя, однако, к угнетению дыхания, развитию запоров и лекарственной зависимости.

Эфедрин стимулирует дыхание, расширяет бронхи и (за счет сосудосуживающего действия) устраняет отек слизистой оболочки бронхов.

Базиликовое масло оказывает седативное (слабое), противомикробное и спазмолитическое действие.

Показания к применению:

Сухой кашель:

- бронхит;
- трахеобронхит;
- ХОБЛ;
- бронхиальная астма;
- коклюш;
- бронхопневмония.

Относится к болезням:

- [Астма](#)
- [Бронхиальная астма](#)
- [Бронхит](#)
- [Бронхопневмония](#)
- [Кашель](#)
- [Коклюш](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- коронарный атеросклероз;
- стенокардия;
- тиреотоксикоз;
- артериальная гипертензия;
- бессонница;
- хроническая сердечная недостаточность;
- феохромоцитома;
- закрытоугольная глаукома;
- гипертрофия предстательной железы (в случае наличия остаточной мочи);
- детский возраст (до 3 лет).

С *осторожностью*: больным, склонным к развитию лекарственной зависимости.

Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым** - по 1 ст.л. (15 мл) 3-4 раза/сут. **Детям старше 3 лет** - 1 ч.л. (5 мл) 3 раза/сут, **детям старше 10 лет** - 2 ч.л. 3 раза/сут.

Побочное действие:

Повышение АД, тахикардия, тошнота, головокружение.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, снижение аппетита, возбуждение, тремор конечностей, нарушение кровообращения, головокружение, задержка мочи.

Лечение: промывание желудка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Снижает гипотензивное действие симпатолитиков.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Бронхотон

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Противопоказан в детском возрасте до 3 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bronhoton>