Бруснивер



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Брусники листья
- Зверобоя продырявленного трава
- Череды трехраздельной трава
- Шиповника плоды

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сбор растительный - сырье измельченное***	**1 пачка**
листья брусники	50%
трава зверобоя продырявленного	20%
трава череды трехраздельной	10%
плоды шиповника	20%

25 г - пачки картонные.
30 г - пачки картонные.
35 г - пачки картонные.
50 г - пачки картонные.
75 г - пачки картонные.
100 г - пачки картонные.

◊ ***Сбор растительный - порошок***	**1 фильтр-пакет**
листья брусники	50 %
травы зверобоя	20 %
трава череды трехраздельной	10 %
плоды шиповника	20 %

2 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Сбор обладает противомикробной активностью в отношении стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки, протея и некоторых других микроорганизмов. Оказывает противовоспалительное и диуретическое действие.

Показания к применению:

В комплексной терапии заболеваний в урологии, гинекологии и проктологии.

Относится к болезням:

- Проктит

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Внутрь или местно, в виде свежеприготовленного отвара или настоя.

Отвар: один брикет (8 г) заливают 500 мл кипящей воды, настаивают в течение 1 ч и кипятят под крышкой на слабом огне в течение 15 мин, охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин.

Настой: один брикет заливают в термосе 500 мл кипящей воды и настаивают не менее 2 ч.

Полученное этими способами водное извлечение процеживают и применяют в теплом неразбавленном (внутрь, микроклизмы) или разбавленном в 2 раза (орошения, спринцевания, ванночки, примочки) виде.

Внутрь назначают в дозах 1/4-1/3 стакана 3-4 раза/сут.

Наружно применяют в теплом виде. При этом для орошений, спринцеваний, ванночек отвар или настой разбавляют в 2-4 раза, для микроклизм используют по 25-50 мл неразбавленного теплого отвара (настоя).

В урологии *при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей (циститы, уретриты) и простатите* отвар (настой) применяют внутрь по указанной схеме в течение 1-3 нед. При *хроническом течении заболевания* длительность лечения может быть увеличена до нескольких месяцев. Одновременно можно применять местно (микроклизмы) в течение 1-2 нед 1-2 раза/сут.

В гинекологии применяют при *вагинитах, вульвитах, кольпитах* внутрь в течение 2-4 нед и одновременно местно (ванночки, орошения, спринцевания, примочки, микроклизмы) - теплый неразбавленный отвар (настой) 1-2 раза/сут.

В проктологии (при *проктитах, воспалениях геморроидальных узлов, трещинах анального отверстия*) применяют в течение 1-3 нед одновременно внутрь и местно, в виде теплых примочек (1-3 раза/сут) и микроклизм (по 50 мл на ночь); при колитах - только внутрь.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Источник: http://drugs.thead.ru/Brusniver