

[Бускопан \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [A03BB01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гиосцина бутилбромид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Суппозитории ректальные** белые или цвета слоновой кости, гладкие, продолговатые.

	1 супп.
гиосцина бутилбромид	10 мг

Вспомогательные вещества: вода очищенная - 10 мг, твердый жир W45 - 1610 мг.

5 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — м-холиноблокирующее.

Фармакодинамика

Бускопан (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру внутренних органов, снижает секрецию пищеварительных желез. Будучи четвертичным аммониевым производным, не проходит через ГЭБ, поэтому не оказывает антихолинергического действия на ЦНС.

Показания к применению:

- спастические состояния ЖКТ, желчевыводящих путей, мочеполовых путей (в т.ч. почечная колика, желчная колика, кишечная колика, холецистит, пилороспазм);
- спастическая дискинезия желчевыводящих путей и желчного пузыря;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения (в составе комплексной терапии);
- альгодисменорея.

Относится к болезням:

- [Альгодисменорея](#)
- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Желчная колика](#)
- [Кишечная колика](#)
- [Кишечные колики](#)
- [Пилороспазм](#)
- [Почечная колика](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

- закрытоугольная глаукома;
- миастения;
- мегаколон;
- повышенная чувствительность к гиосцин-N-бутилбромиду и другим компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 6 лет назначают внутрь по 1-2 таб. 3 раз/сут или ректально по 1-2 суппозитория 3 раза/сут. Длительность лечения устанавливает врач.

Таблетки следует принимать внутрь, запивая достаточным количеством воды.

Суппозиторий вводят в прямую кишку заостренным концом вперед.

Побочное действие:

Побочное действие, связанное с холиноблокирующим действием препарата: сухость во рту, сухость кожных покровов, тахикардия, сонливость, парез accommodation; возможно затруднение мочеиспускания (обычно слабо выражено и проходит самостоятельно).

Аллергические реакции: кожная сыпь; в редких случаях - затруднение дыхания.

Передозировка:

В настоящее время случаи передозировки препарата Бускопан не описаны, поэтому следующие симптомы и рекомендации носят теоретический характер.

Бускопан (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Симптомы: задержка мочи, сухость во рту, покраснение кожи, тахикардия, угнетение моторики ЖКТ, преходящие нарушения зрения.

Лечение: промывание желудка с активированным углем и затем 15% раствором магния сульфата. В дальнейшем показано применение холиномиметиков. При глаукоме местно назначают пилокарпин (в виде глазных капель). При необходимости назначают холиномиметики для системного применения (например, вводят в/м или в/в неостигмин в дозе 0.5-2.5 мг); проводят поддерживающую и симптоматическую терапию; при параличе дыхательной мускулатуры - интубация и ИВЛ; при задержке мочи - катетеризация мочевого пузыря.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В настоящее время нет данных об отрицательном влиянии препарата на плод. Однако при беременности (особенно в I триместре) препарат следует назначать с осторожностью.

Безопасность применения препарата в период лактации не установлена. Однако о случаях нежелательных эффектов у новорожденных не сообщается.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Бускопан может усилить антихолинергическое действие антигистаминных препаратов, трициклических антидепрессантов, хинидина, амантадина, дизопирамида.

Одновременное применение Бускопана и антагонистов допамина (метоклопрамида) приводит к ослаблению действия на ЖКТ обоих препаратов.

Бускопан может усиливать тахикардию, вызываемую бета-адреномиметиками.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью назначают препарат при подозрении на кишечную непроходимость (в т.ч. стеноз привратника), при обструкции мочевыводящих путей (в т.ч. доброкачественная гиперплазия предстательной железы), при склонности к тахикардии (в т.ч. мерцательная аритмия).

Условия хранения:

Препарат в форме таблеток следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Препарат в форме суппозиторий ректальных следует хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Buskopan_svechi