

## [Бутадион-Обл](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

НПВС из группы производных пиразолона. Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие, обусловленное угнетением активности ЦОГ и уменьшением синтеза простагландинов.

#### **Фармакокинетика**

При приеме внутрь обладает высокой степенью абсорбции, биодоступность составляет 85-90% и снижается при длительном приеме.  $C_{max}$  достигается через 1-2 ч. Связь с белками плазмы - более 95%. Метаболизируется в печени с образованием двух основных метаболитов.  $T_{1/2}$  - 18-24 ч. Выводится почками 70% (5% в неизменном виде), 30% - через кишечник в виде метаболитов.

### **Показания к применению:**

Для приема внутрь и парентерально: ревматизм, инфекционный неспецифический полиартрит, болезнь Бехтерева, подагрический артрит, псориатический артрит, узловатая эритема, малая хорея.

Для наружного применения: дерматиты, вызванные механическими воздействиями, ожоги I и II степени небольшой площади, солнечные ожоги, укусы насекомых, воспалительные инфильтраты, растяжения мышц и сухожилий.

В качестве вспомогательного средства: ревматический артрит, артроз, синовиты.

### **Относится к болезням:**

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Дерматит](#)
- [Инфекции](#)
- [Инфильтраты](#)
- [Малая хорея](#)
- [Ожоги](#)
- [Подагра](#)
- [Полиартрит](#)
- [Растяжение](#)
- [Ревматизм](#)
- [Синовит](#)

- [Узловатая эритема](#)
- [Хорея](#)
- [Эритема](#)

## **Противопоказания:**

Для приема внутрь и парентерально: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушения функции печени и почек, заболевания органов кроветворения, лейкопения, хроническая сердечная недостаточность, аритмии. Беременность. Повышенная чувствительность к производным пиразолона. Для наружного применения: трофические поражения кожи с возникновением язв, экзем; повышенная чувствительность к производным пиразолона.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь применяют по 200-400 мг 3-4 раза/сут. После клинического улучшения дозу постепенно снижают. Парентерально применяют с целью купирования острых проявлений заболеваний в индивидуально подобранных дозах. Наружно применяют 2-3 раза/сут.

## **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* диспепсия, НПВС-гастропатия, абдоминальные боли, тошнота, рвота, изжога, диарея или запор; при длительном применении в больших дозах - изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, афтозный стоматит, глоссит, эрозивный эзофагит, кровотечение (желудочно-кишечное, десневое, геморроидальное), нарушение функции печени.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* повышение АД, сердечная недостаточность, тахикардия.

*Со стороны ЦНС:* головная боль, головокружение, сонливость, депрессия, возбуждение.

*Со стороны органов чувств:* снижение слуха, шум в ушах.

*Со стороны системы кроветворения:* агранулоцитоз, лейкопения, анемия, тромбоцитопения.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, зуд, крапивница, бронхоспазм, отечный синдром, отек Квинке.

*Прочие:* усиление потоотделения, маточные кровотечения.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Для приема внутрь противопоказанием является беременность.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении с антикоагулянтами усиливается их антикоагулянтное действие.

При одновременном применении с трициклическими антидепрессантами возможно нарушение абсорбции фенилбутазона.

При одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой уменьшается ее урикозурическое действие.

При одновременном применении с метилфенидатом повышается концентрация фенилбутазона в плазме крови.

Описаны случаи повышения концентрации фенитоина в плазме крови с развитием токсических реакций при его одновременном применении с фенилбутазоном.

При одновременном применении с фенобарбиталом наблюдается небольшое уменьшение концентрации фенилбутазона в плазме крови.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При системном применении фенилбутазона, а также при длительном применении мази на мокнущей, лишенной эпителия коже, необходим систематический контроль картины крови.

## **Бутадион-Обл**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Раствор для инъекций содержит лидокаин.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Во время лечения следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

### **При нарушениях функции почек**

Для приема внутрь противопоказанием являются нарушения функции почек.

### **При нарушениях функции печени**

Для приема внутрь противопоказанием являются нарушения функции печени.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Butadion-Ob1>