

Быструмгель



Код АТХ:

- [M02AA10](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кетопрофен](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения 2.5%** бесцветный, почти прозрачный, со специфическим запахом; допускается наличие опалесценции.

	1 г
кетопрофен	25 мг

Вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый) ректификованный, нипагин, карбомер, триметамол, масло лавандовое, масло неролиевое, вода очищенная.

30 г - тубы (1) - пачки картонные.

50 г - тубы (1) - пачки картонные.

100 г - тубы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС, производное пропионовой кислоты. Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное действие.

Ингибируя ЦОГ-1 и ЦОГ-2, угнетает синтез простагландинов. Обладает антибрадикининовой активностью, стабилизирует лизосомальные мембраны. Снижает выделение цитокинов, тормозит активность нейтрофилов.

При суставном синдроме ослабляет боль в суставах в покое и при движении, уменьшает утреннюю скованность и припухлость суставов, способствует увеличению объема движений.

Фармакокинетика

Всасывание

При наружном применении геля происходит чрезвычайно медленное трансдермальное всасывание кетопрофена, что обеспечивает поддержание его концентрации в воспаленных тканях в пределах терапевтического уровня в течение длительного времени. Абсорбция в системный кровоток незначительна. Практически не кумулирует. Биодоступность геля около 5%.

Распределение

Кетопрофен хорошо проникает в синовиальную жидкость и соединительную ткань.

Показания к применению:

Воспалительные или травматические поражения суставов, сухожилий, связок и мышц:

- артрит, периартрит;
- тендинит, тендосиновит;
- бурсит;
- ушибы, повреждения связок, вывихи, повреждения мениска колена;
- кривошея;
- люмбаго.

Флебит, перифлебит.

Относится к болезням:

- [Бурсит](#)
- [Вывих](#)
- [Вывихи](#)
- [Кривошея](#)
- [Люмбаго](#)
- [Тендинит](#)
- [Травмы](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)

Противопоказания:

- дерматозы;
- экзема;
- инфицированные ссадины и раны;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст;
- повышенная чувствительность к кетопрофену или другим компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат наносят на кожу болезненного участка 2 раза/сут, выдавливая из тубы около 3-5 см геля или больше (в зависимости от площади болезненного участка), распределяют равномерным тонким слоем и осторожно втирают до полного всасывания.

С целью повышения эффективности терапии возможно применение геля под сухую окклюзионную повязку.

Побочное действие:

В единичных случаях: аллергические реакции, которые требуют отмены препарата, фотосенсибилизация.

Передозировка:

Случаев передозировки при применении препарата Быструмгель не описано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время случаев лекарственного взаимодействия препарата Быструмгель с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется наносить гель на открытые раны или поврежденные участки кожи.

Нельзя допускать попадания геля на слизистые оболочки и в глаза.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bystrumgel>