

## Цефамадар



### Код АТХ:

- [A12AA03](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Таблетки гомеопатические. По 20 табл. в блистере из пленки ПВХ/ПВДХ белого цвета и упаковочной алюминиевой фольги. По 5 или 10 бл. помещают в картонную пачку.

### Состав:

Таблетки гомеопатические	1 табл.
<i>активное вещество:</i>	
<i>Calotropis gigantea (Madar) D4</i>	250 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат — 9 мг; магния стеарат — 1 мг	

### Описание:

Круглые двояковыпуклые таблетки белого цвета без запаха.

### Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — гомеопатическое, нормализующее обменные процессы.

#### **Фармакодинамика**

Гомеопатический препарат, действие которого обусловлено активными компонентами, входящими в его состав *Calotropis gigantea (Madar)*.

**Показания к применению:**

— ожирение (в составе комплексной терапии).

**Относится к болезням:**

- [Ожирение](#)

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- непереносимость лактозы,
- недостаточность лактазы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- детский возраст до 6 лет.

**Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь, перед едой.

**Взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 1 таблетке 3 раза/сут.

**Детям от 6 до 12 лет** назначают по 1 таблетке 2 раза/сут.

Рекомендуемая длительность применения препарата Цефамандар составляет 1 месяц. В случае необходимости продолжения курса лечения дальнейшее применение препарата должно контролироваться врачом. Поскольку избыточность массы тела для каждого пациента является индивидуальным параметром и требует разного времени лечения, длительность приема препарата Цефамандар определяется врачом индивидуально.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции, тошнота, диарея, головокружение, головная боль.

**Передозировка:**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания (опыт клинического применения препарата у данной категории пациентов отсутствует).

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Перед началом применения лекарственного средства необходимо убедиться, что причиной ожирения не является какое-либо заболевание и проконсультироваться с врачом.

В начале применения гомеопатического лекарственного средства может наблюдаться временное ухудшение текущего состояния пациентов. В таких случаях следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к

## **Цефмадар**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

врачу.

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами), т.к. может вызывать головокружение.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15 до 25°C в оригинальной упаковке.

Не применять по истечении срока годности.

### **Срок годности:**

5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Cefamadar>