Цефамадар



Код АТХ:

- A12AA03

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки гомеопатические. По 20 табл. в блистере из пленки ПВХ/ПВДХ белого цвета и упаковочной алюминиевой фольги. По 5 или 10 бл. помещают в картонную пачку.

Состав:

Таблетки гомеопатические	1 табл.
активное вещество:	
Calotropis gigantea (Madar) D4	250 мг
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат — 9 мг; магния стеарат — 1 мг	

Описание:

Круглые двояковыпуклые таблетки белого цвета без запаха.

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — гомеопатическое, нормализующее обменные процессы.

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, действие которого обусловлено активными компонентами, входящими в его состав *Calotropis gigantea (Madar)*.

Показания к применению:

— ожирение (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- Ожирение

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— непереносимость лактозы,

— недостаточность лактазы;

— глюкозо-галактозная мальабсорбция;

— детский возраст до 6 лет.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь, перед едой.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таблетке 3 раза/сут.

Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таблетке 2 раза/сут.

Рекомендуемая длительность применения препарата Цефамадар составляет 1 месяц. В случае необходимости продолжения курса лечения дальнейшее применение препарата должно контролироваться врачом. Поскольку избыточность массы тела для каждого пациента является индивидуальным параметром и требует разного времени лечения, длительность приема препарата Цефамадар определяется врачом индивидуально.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, тошнота, диарея, головокружение, головная боль.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания (опыт клинического применения препарата у данной категории пациентов отсутствует).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед началом применения лекарственного средства необходимо убедиться, что причиной ожирения не является какое-либо заболевание и проконсультироваться с врачом.

В начале применения гомеопатического лекарственного средства может наблюдаться временное ухудшение текущего состояния пациентов. В таких случаях следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к

врачу.

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами), т.к. может вызывать головокружение.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15 до 25°C в оригинальной упаковке.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cefamadar