

## Цефанорм



### **Код АТХ:**

- [J01DE02](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Цефпиром](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Показания к применению:**

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами: инфекции дыхательных путей (в т.ч. пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры); осложненные инфекции верхних и нижних отделов мочевыводящих путей; гинекологические инфекции (в т.ч. аднексит, эндометрит, параметрит, пельвиоперитонит, абсцесс дугласова пространства, абсцесс бартолиновой железы); инфекции кожи и мягких тканей; бактериемия, септицемия; инфекции у пациентов с нейтропенией и ослабленным иммунитетом.

### **Относится к болезням:**

- [Абсцесс](#)
- [Аднексит](#)
- [Бартолинит](#)
- [Инфекции](#)
- [Параметрит](#)
- [Плеврит](#)
- [Пневмония](#)
- [Эмпиема](#)
- [Эмпиема плевры](#)
- [Эндометрит](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к пенициллинам, цефалоспориновым и другим бета-лактамам антибиотикам.

## Способ применения и дозы:

Вводят только в/в.

Режим дозирования индивидуальный, в зависимости от тяжести инфекции, чувствительности микроорганизмов, почечной функции.

Для пациентов с нормальной функцией почек (КК>50 мл/мин) при тяжелых инфекциях разовая доза составляет 1 г, суточная доза - 2 г, интервал между введениями - 12 ч.

Для пациентов с осложненными, угрожающими жизни инфекциями разовая доза составляет 2 г, суточная доза - 4 г, интервал между введениями - 12 ч.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* диарея, тошнота, рвота, псевдомембранозный колит, боль в животе, запор, изменение вкуса, повышение АЛТ, АСТ, ЩФ, общего билирубина.

*Со стороны ЦНС:* головокружение, головная боль, спутанность сознания, бессонница, обратимая энцефалопатия.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* нарушение сердечного ритма.

*Со стороны мочевыделительной системы:* интерстициальный нефрит, почечная недостаточность.

*Со стороны свертывающей системы крови:* увеличение протромбинового времени или АЧТВ, кровоизлияния.

*Со стороны системы кроветворения:* эозинофилия, транзиторная тромбоцитопения, транзиторная лейкопения и нейтропения, анемия.

*Со стороны обмена веществ:* временное повышение азота мочевины крови и/или креатинина сыворотки.

*Аллергические реакции:* сыпь, зуд, крапивница, анафилактические реакции.

*Местные реакции:* флебиты, воспаление или боль в месте инъекции.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.

При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении цефпиромы с аминогликозидами, фуросемидом и другими "петлевыми" диуретиками, возможно повышение нефро- и ототоксичности.

Пробенецид замедляет экскрецию цефпиромы из организма и, тем самым, увеличивает его концентрацию в плазме крови.

При одновременном введении раствора цефпиромы с растворами метронидазола, ванкомицина, гентамицина возможно фармацевтическое взаимодействие (каждый антибиотик следует вводить отдельно).

## Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применять у пациентов с любыми формами аллергии, особенно при аллергических реакциях на лекарственные препараты в анамнезе. При развитии аллергических реакций лечение следует прекратить.

При длительном применении цефпиромы следует принимать меры для предупреждения развития дисбактериоза, а также следить за картиной крови и функцией почек. В первые недели лечения возможно развитие псевдомембранозного колита.

## **Цефанорм**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Cefanorm>