Цефазолин-Акос



Код АТХ:

• J01DB04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Цефазолин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 фл.
цефазолин (в форме натриевой соли)	500 мг
Φ	

Флаконы объемом 10 мл (1) - пачки картонные.

Флаконы объемом 10 мл (10) - пачки картонные.

Флаконы объемом 10 мл (50) - пачки картонные.

Порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 фл.
цефазолин (в форме натриевой соли)	1 r
+ (1)	

Флаконы объемом 10 мл (1) - пачки картонные.

Флаконы объемом 10 мл (10) - пачки картонные.

Флаконы объемом 10 мл (50) - пачки картонные.

Порошок для приготовления раствора для в/м введения белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 фл.
цефазолин (в форме натриевой соли)	500 мг

Флаконы объемом 10 мл (1) - пачки картонные.

Флаконы объемом 10 мл (10) - пачки картонные.

Флаконы объемом 10 мл (50) - пачки картонные.

Порошок для приготовления раствора для в/м введения белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 фл.
цефазолин (в форме натриевой соли)	1 r

Флаконы объемом 10 мл (1) - пачки картонные.

Флаконы объемом 10 мл (10) - пачки картонные.

Флаконы объемом 10 мл (50) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

• Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антибактериальное широкого спектра.

Подавляет биосинтез клеточной стенки бактерий, оказывает бактерицидное действие...

Фармакодинамика

Имеет широкий спектр антимикробного действия. активен в отношении грамположительных (Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus (не продуцирующие и продуцирующие пенициллиназу; Streptococcus pneumoniae), Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis и грамотрицательных (Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Shigella spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Treponema spp., Leptospira spp.) микроорганизмов. Активен в отношении Наеторніци influenzae, некоторых штаммов Enterobacter и Enterococcus. Устойчивы— индолположительные штаммы протея, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Serratia spp., анаэробные микроорганизмы, метициллин-резистентные штаммы Staphylococcus spp.

Показания к применению:

— сепсис;
— перитонит;
— эндокардит;
— инфекции дыхательных путей;
— инфекции мочевыводящих путей;
— сифилис;
— гонорея;
— инфекции костей и суставов;
— профилактика послеоперационных осложнений.

Относится к болезням:

- Гонорея
- Инфекции
- Инфекции мочевыводящих путей
- Перитонит
- Сепсис
- Сифилис
- Эндокардит

Противопоказания:

— повышенная ч	УВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К	цефалоспоринам;

- беременность;
- возраст до 1 мес.

Способ применения и дозы:

Препарат вводят в/м и в/в (струйно и капельно). При в/м введении разовая доза для **взрослых** составляет 0.25-1 г каждые 8-12 ч. Средняя суточная доза составляет 0.75-1.5 г.

При тяжелых инфекциях назначают по 0.5-1 г каждые 6-8 ч. Максимальная суточная доза - 6 г.

Для профилактики послеоперационных осложнений вводят в дозе 1 г за 30 мин до операции, 0.5-1 г во время операции и по 0.5-1 г каждые 6-8 ч в течение суток после операции.

Детям старше 1 мес назначают в суточной дозе 25-50 мг/кг, при *тяжелых инфекциях* - 100 мг/кг. Суточная доза разделяется на 2-3 приема.

При назначении препарата следует определить чувствительность к нему выделенных возбудителей, используя диски, содержащие 30 мкг цефазолина.

При нарушениях выделительной функции почек у взрослых дозы препарата уменьшают, интервалы между введениями увеличивают. Начальная доза составляет 500 мг независимо от степени нарушений функции почек.

Длительность лечения составляет 7-14 дней и более в зависимости от тяжести заболевания.

Правила приготовления раствора

Для приготовления раствора для в/м введения к содержимому флакона (500 мг или 1~г) добавляют 2-3 мл воды для инъекций.

Для приготовления раствора для в/в струйного введения содержимое флакона (500 мг или $1 \, r$) растворяют в $10 \, мл$ 0.9% раствора натрия хлорида.

Для приготовления раствора для в/в капельного введения содержимое флакона (500 мг или 1 г) растворяют в 100-150 мл 0.9% раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, эозинофилия.

Со стороны мочевыделительной системы: у пациентов с почечной недостаточностью при применении препарата в больших дозах (6 г) может развиться почечная недостаточность.

Местные реакции: при в/в введении - флебит.

Прочие: желудочно-кишечные расстройства, дисбактериозы, суперинфекция, вызываемая устойчивыми к антибиотику штаммами.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Цефазолин-АКОС не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности.

В грудном молоке определяются низкие концентрации цефазолина.

Применение в период лактации оправдано лишь в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Отмечается синергизм антибактериального действия при одновременном применении препарата с аминогликозидами, ванкомицином, рифампицином.

Особые указания и меры предосторожности:

При развитии аллергических реакций введение препарата следует прекратить и назначить соответствующую десенсибилизирующую терапию.

При развитии почечной недостаточности следует снизить дозу препарата и лечение в дальнейшем проводить под контролем динамики содержания азота мочевины и креатинина в крови.

Не рекомендуется назначать препарат одновременно с антикоагулянтами и диуретиками (фуросемид, этакриновая кислота).

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 5°С.

Приготовленный раствор для инъекций годен к применению в течение 24 ч при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Срок годности:

3 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cefazolin-Akos