

## [Цефекон Д \(свечи\)](#)



### **Код АТХ:**

- [N02BE01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Парацетамол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Суппозитории ректальные для детей** белого или белого с кремоватым или желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

	<b>1 супп.</b>
парацетамол	50 мг
"_	100 мг
"_	250 мг

*Вспомогательные вещества:* витепсол.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

## Цефекон Д (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Фармакологическое действие— противовоспалительное, жаропонижающее, обезболивающее.

### Фармакодинамика

Парацетамол обладает обезболивающим и жаропонижающим действием. Блокирует циклооксигеназу в ЦНС, воздействуя на центры боли и терморегуляции. В воспаленных тканях клеточные пероксидазы нейтрализуют влияние парацетамола на циклооксигеназу, что объясняет отсутствие значимого противовоспалительного эффекта.

Препарат не оказывает отрицательного влияния на водно-солевой обмен (задержка натрия и воды) и слизистую ЖКТ.

### Показания к применению:

Препарат предназначен к применению у детей в возрасте от 3 мес до 12 лет.

У детей в возрасте от 1 до 3 мес возможно однократное применение препарата для снижения температуры после вакцинации (возможность применения препарата по другим показаниям решается врачом индивидуально).

Применяют в качестве:

— жаропонижающего средства при ОРВИ, гриппе, детских инфекциях, поствакцинальных реакциях и других состояниях, сопровождающихся повышением температуры тела;

— анальгезирующего средства при болевом синдроме слабой и умеренной интенсивности, в т.ч.: головная боль, зубная боль, боли в мышцах, невралгии, боли при травмах и ожогах.

### Относится к болезням:

- [Болевой синдром](#)
- [Головная боль](#)
- [Грипп](#)
- [Жар](#)
- [Зубная боль](#)
- [Инфекции](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [ОРВИ](#)
- [Травмы](#)

### Противопоказания:

— возраст до 1 месяца;

— повышенная чувствительность к парацетамолу.

С осторожностью применяют препарат при нарушениях функции печени и почек, синдроме Жильбера, Дубина-Джонсона, Ротора, заболеваниях системы крови (анемия, тромбоцитопения, лейкопения), дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

### Способ применения и дозы:

Препарат применяют ректально. Суппозитории вводят в прямую кишку ребенка после очистительной клизмы или самопроизвольного опорожнения кишечника.

Режим дозирования устанавливают в зависимости от возраста и массы тела. Средняя разовая доза составляет 10-15 мг/кг массы тела ребенка. Препарат в разовой дозе вводят 2-3 раза/сут, через 4-6 ч. Максимальная суточная доза препарата не должна превышать 60 мг/кг массы тела.

Возраст	Масса тела	Разовая доза
1-3 мес	4-6 кг	1 супп. по 50 мг (50 мг)
3-12 мес	7-10 кг	1 супп. по 100 мг (100 мг)
от 1 года до 3 лет	11-16 кг	1-2 супп. по 100 мг (100-200 мг)
от 3 до 10 лет	17-30 кг	1 супп. по 250 мг (250 мг)
от 10 до 12 лет	31-35 кг	2 супп. по 250 мг (500 мг)

## **Цефекон Д (свечи)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

При применении препарата в качестве жаропонижающего средства длительность курса лечения составляет 3 дня; в качестве обезболивающего - 5 дней. При необходимости врач может продлить курс лечения.

### **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* возможны тошнота, рвота, боли в животе.

*Аллергические реакции:* сыпь на коже и слизистых оболочках, зуд, крапивница, отек Квинке.

*Со стороны системы кроветворения:* редко - анемия, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз.

При длительном применении в высоких дозах возможно развитие гепатотоксического и нефротоксического (интерстициальный нефрит и папиллярный некроз) действия, гемолитической анемии, апластической анемии, метгемоглобинемии, панцитопении.

### **Передозировка:**

Данные по передозировке препарата Цефекон Д не предоставлены.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Индукторы микросомального окисления в печени (фенитоин, этанол, барбитураты, флумецинол, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты), этанол, гепатотоксичные лекарственные средства увеличивают продукцию гидроксилированных активных метаболитов, что обуславливает возможность развития тяжелой интоксикации даже при небольшой передозировке.

Ингибиторы микросомального окисления (циметидин) снижают риск гепатотоксического действия.

При приеме одновременно с салицилатами вероятность развития нефротоксического действия возрастает.

При совместном применении с парацетамолом усиливаются токсические эффекты хлорамфеникола.

При совместном применении с парацетамолом усиливается действие антикоагулянтов непрямого действия и снижается эффективность урикозурических средств.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Пациент должен быть предупрежден о необходимости обратиться к врачу при продолжении лихорадки более 3 дней и болевого синдрома более 5 дней.

Следует избегать одновременного применения с другими парацетамолосодержащими препаратами, т.к. это может вызвать передозировку парацетамола.

При применении препарата более 5-7 дней следует контролировать показатели периферической крови и функциональное состояние печени. Парацетамол искажает показатели лабораторных исследований при количественном определении глюкозы и мочевой кислоты в плазме.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

## **Цефекон Д (свечи)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Cefekon\\_D\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Cefekon_D_svechi)