Цефекон Н



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории ректальные***	**1 супп.**
напроксен	75 мг
кофеин	50 мг
салициламид	600 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Напроксен и салициламид являются НПВС, механизм действия которых связан с ингибированием синтеза простагландинов и влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе.

Кофеин оказывает психостимулирующее, аналептическое, спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру, снижает агрегацию тромбоцитов и высвобождает гистамин из тучных клеток.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Цефекон Н не предоставлены.

Показания к применению:

В качестве обезболивающего средства при болевом синдроме легкой и средней тяжести:

— невралгия;

— миалгия;

— ишиас;

— люмбаго;

— дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит);

— головная боль, мигрень;

— зубная боль;

— первичная альгодисменорея.

В качестве жаропонижающего средства:

— лихорадочный синдром при простудных, инфекционных и воспалительных заболеваниях.

Относится к болезням:

- Альгодисменорея
- Анкилозирующий спондилоартрит
- Болевой синдром
- Жар
- Зубная боль
- Инфекции
- Ишиас
- Лихорадка
- Люмбаго
- Миалгия
- Мигрень
- Невралгия
- Неврит
- Остеоартрит
- Остеоартроз
- Остеохондроз
- Спондилоартрит

Противопоказания:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;

— кровоточивость;

— выраженная почечная или печеночная недостаточность;

— артериальная гипертензия;

— органические заболевания сердечно-сосудистой системы;

— хроническая сердечная недостаточность;

— повышенная возбудимость;

— бессонница;

— закрытоугольная глаукома;

— бронхоспазм (в т.ч. обусловленный приемом НПВС);

— пожилой возраст;

— детский и подростковый возраст до 16 лет;

— беременность;

— лактация (грудное вскармливание);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует применять после очистительной клизмы или самопроизвольного опорожнения кишечника.

Назначают по 1 суппозиторию 1-3 раза/сут. Суппозиторий вводят глубоко в прямую кишку, после чего необходимо пребывание пациента в постели в течение 30-40 мин.

Продолжительность применения в качестве обезболивающего средства - не более 5 дней; в качестве жаропонижающего средства - не более 3 дней.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: головокружение, возбуждение, сонливость, шум в ушах, головокружение, замедление скорости психомоторных реакций.

Со стороны системы кроветворения: тромбоцитопения, гранулоцитопения, апластическая анемия.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - тахикардия, повышение АД.

Местные реакции: зуд и боль в прямой кишке.

Прочие: аллергические реакции, нарушения функции печени, нарушения функции почек.

Побочные эффекты имеют легкую степень тяжести и не требуют прекращения терапии или каких-либо медицинских манипуляций.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Цефекон Н не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Цефекон Н противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с Цефеконом Н уменьшается гипотензивное действие бета-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ и усиливается фармакологическое действие антикоагулянтов и производных сульфонилмочевины.

Особые указания и меры предосторожности:

При появлении на фоне применения препарата зуда и неприятных ощущений в прямой кишке следует ввести в прямую кишку теплое подсолнечное масло в количестве 1 столовой ложки в виде клизмы и временно прекратить применение препарата.

При нарушениях функции почек

Противопоказано при выраженной почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Противопоказано при выраженной печеночной недостаточности.

Применение в пожилом возрасте

Препарат противопоказан пациентам пожилого возраста.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям и подросткам до 16 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cefekon_N