

## [Цефекон Н \(свечи\)](#)



### Код АТХ:

- [N02BA55](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

♦ <b>Суппозитории ректальные</b>	<b>1 супп.</b>
напроксен	75 мг
кофеин	50 мг
салициламид	600 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее.

Цефекон Н оказывает анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Напроксен и салициламид являются НПВС, механизм действия которых связан с ингибированием синтеза ПГ и влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе. Кофеин оказывает психостимулирующее, analeптическое и спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру, стимулирует поперечно-полосатую мускулатуру, снижает агрегацию тромбоцитов и высвобождает гистамин из тучных клеток..

## Показания к применению:

В качестве обезболивающего средства при болевом синдроме легкой и средней тяжести:

- невралгия;
- миалгия;
- ишиас;
- люмбаго;
- дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит);
- головная боль, мигрень;
- зубная боль;
- первичная альгодисменорея.

В качестве жаропонижающего средства:

- лихорадочный синдром при простудных, инфекционных и воспалительных заболеваниях.

## Относится к болезням:

- [Альгодисменорея](#)
- [Анкилозирующий спондилоартрит](#)
- [Болевой синдром](#)
- [Головная боль](#)
- [Жар](#)
- [Зубная боль](#)
- [Инфекции](#)
- [Ишиас](#)
- [Лихорадка](#)
- [Люмбаго](#)
- [Миалгия](#)
- [Мигрень](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Остеохондроз](#)
- [Спондилоартрит](#)

## Противопоказания:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- кровоточивость;
- выраженная почечная или печеночная недостаточность;
- артериальная гипертензия;
- органические заболевания сердечно-сосудистой системы;
- хроническая сердечная недостаточность;
- повышенная возбудимость;
- бессонница;
- закрытоугольная глаукома;
- бронхоспазм (в т.ч. обусловленный приемом НПВС);
- пожилой возраст;
- детский и подростковый возраст до 16 лет;

- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат следует применять после очистительной клизмы или самопроизвольного опорожнения кишечника.

Назначают по 1 суппозиторию 1-3 раза/сут. Суппозиторий вводят глубоко в прямую кишку, после чего необходимо пребывание пациента в постели в течение 30-40 мин.

Продолжительность применения в качестве обезболивающего средства - не более 5 дней; в качестве жаропонижающего средства - не более 3 дней.

## Побочное действие:

*Со стороны ЦНС:* головокружение, возбуждение, сонливость, шум в ушах, головокружение, замедление скорости психомоторных реакций.

*Со стороны системы кроветворения:* тромбоцитопения, гранулоцитопения, апластическая анемия.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* редко - тахикардия, повышение АД.

*Местные реакции:* зуд и боль в прямой кишке.

*Прочие:* аллергические реакции, нарушения функции печени, нарушения функции почек.

Побочные эффекты имеют легкую степень тяжести и не требуют прекращения терапии или каких-либо медицинских манипуляций.

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата Цефекон Н не предоставлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Цефекон Н противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с Цефеконом Н уменьшается гипотензивное действие бета-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ и усиливается фармакологическое действие антикоагулянтов и производных сульфонилмочевины.

## Особые указания и меры предосторожности:

При появлении на фоне применения препарата зуда и неприятных ощущений в прямой кишке следует ввести в прямую кишку теплое подсолнечное масло в количестве 1 столовой ложки в виде клизмы и временно прекратить применение препарата.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступном для детей месте.

## **Цефекон Н (свечи)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Cefekon\\_N\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Cefekon_N_svechi)